

Beitrag zur Theorie der natürlichen Blende optischer Instrumente.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Philosophischen Fakultät

der

Universität Rostock

vorgelegt von


Willy Hinrichs

aus Berlin

Berlin 1910

Emil Ebering.

Mittelstraße 39.



Referent: Professor Dr. R. H. Weber.

Tag der mündlichen Prüfung: 3. Februar 1910.

Meinen lieben Eltern

in Dankbarkeit zugeeignet.

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.

Kapitel I. Die natürliche Blende in Bezug auf eine halbkugelförmige Konvexplanlinse unter Voraussetzung endlicher Strahlenneigungen zur Achse.

- § 1. Die kaustische Kurve einer halbkugelförmigen Konvexplanlinse.
- § 2. Bedingungen für die Spitze der Kaustik.
- § 3. Die Spitze der Kaustik für die beiden Fälle $\varphi = 0^0$ und $\varphi = 5^0$
- § 4. Die angenäherte Bedingungsgleichung für die Spitze der Kaustik.
- § 5. Ort der natürlichen Blende für verschiedene Strahlenneigungen.

Kapitel II. Die natürliche Blende bei einem beliebigen brechenden System.

- § 1. Formeln zur Durchrechnung eines Strahles im Parachialgebiet.
- § 2. Formeln zur Durchrechnung eines Meridionalbündels.
- § 3. Die Koma und die Bedingung der Komafreiheit.
- § 4. Umformung der Bedingung für die Komafreiheit auf Parachialstrahlen.
- § 5. Transformation der Invarianten $n_k i_k$.
- § 6. Die Seidel'schen Sätze über Nullinvarianten.
- § 7. Bestimmung des Ortes der natürlichen Blende im Objektraum.
- § 8. Ein einfaches Beispiel.

Kapitel III. Anwendung der Theorie der natürlichen Blende auf spezielle Fälle.

- § 1. Die dünne in Luft befindliche Linse.
 - § 2. System aus zwei dünnen Linsen im Abstände e voneinander.
 - § 3. Das Huygens'sche und das Ramsden'sche Okular.
 - § 4. Das symmetrische Doublet.
-



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.

Das Bild, das ein optisches System von einem Objekt erzeugt, wird im allgemeinen mit sehr verschiedenartigen dioptrischen Fehlern behaftet sein. Die wichtigsten dieser Mängel sind: sphärische und chromatische Aberration, Astigmatismus, Koma und Verzeichnung. Je nach dem Zweck, dem das optische System dienen soll, wird man das Hauptaugenmerk auf Beseitigung des einen oder des andern Fehlers richten; immer aber ist es erforderlich, sich bei der Neukonstruktion eines optischen Systems Rechenschaft von der Beschaffenheit des Bildes zu geben und eventl. durch geeignete Aenderung der Konstanten die gewünschte Genauigkeit zu erreichen. Um Kenntniss von der Beschaffenheit eines optischen Bildes zu gewinnen, verfuhr man bisher so, dass man eine Anzahl Hauptstrahlen trigonometrisch durchrechnete unter ziemlich willkürlicher Annahme des Ortes der Aparturblende, denn die Theorie der Eintritts- und Austrittspupille liefert nicht den geringsten Anhalt dafür, welcher Punkt auf der optischen Achse als Mittelpunkt der Aparturblende anzunehmen ist. Für die Anbringung der Blende liess man sich vielmehr von zwei mehr äusserlichen Gesichtspunkten leiten, die Blende sollte nur dazu dienen, die von einem Punkt ausgehende Strahlenmenge und die äusserste Neigung der in Betracht kommenden Strahlen zu bestimmen. Es lässt sich leicht einsehen, zu welchen Irrtümern die willkürliche Wahl des Blendenortes und damit auch der Hauptstrahlen führen musste.

Von einem Punkt P (Fig. 1) aus fallen im Hauptschnitt die einander unendlich nahen Strahlen I, II, III, IV unter endlicher Neigung zur optischen Achse L auf ein brechendes System S . Nach der Brechung mögen sich die Strahlen I' und II' in a , II' und III' in b , III' und IV' in c schneiden. Die drei Punkte a , b , c bilden dann bekanntlich eine




Fig. 1

Koma, d. h. ein Stück einer kaustischen Kurve. Die Strahlenvereinigung in den Punkten a , b , c ist nur von geringer Ordnung, da sich nur zwei Strahlen in einem Punkt schneiden, und infolgedessen optisch wenig wirksam. Die Gesamtheit aller der von P ausgehenden Strahlen weist jedoch nach der Brechung an einer Stelle eine Vereinigung höherer Ordnung auf; die Strahlen bilden an dieser Stelle eine kaustische Spitze, indem sich nicht nur zwei sondern drei Strahlen in einem Punkt streng vereinigen. Diese Stelle, die also frei von Koma ist, muss als Aequivalent des Bildes von P angesprochen werden.

Einer der von P ausgehenden unendlich vielen Strahlen

hat nun die Eigenschaft, nach der Brechung durch diesen Punkt höherer Strahlenvereinigung zu gehen. Dieser „Träger der kaustischen Spitze“ muss als eigentlicher Hauptstrahl angesehen werden. Um jedoch keinen Irrthümern ausgesetzt zu sein — man definiert den Hauptstrahl gewöhnlich anders — nennen wir diesen Strahl, der durch die Spitze der Kaustik geht, nach Herrn Gleichen¹ „Fundamentalstrahl“.

Will man nun die Beschaffenheit eines optischen Bildes untersuchen und rechnet zu diesem Zweck wie es bisher geschah einen beliebigem Strahl (z. B. Strahl III Fig. 1) durch das System durch, so erhält man schliesslich einen meridionalen und einen sagittalen Bildpunkt (b und b' Fig. 1). Bestimmt man so für jede Strahlenneigung den meridionalen und sagittalen Bildpunkt, so bildet die Gesamtheit aller dieser Punkte zwei astigmatische Flächen, eine meridionale ASB (Fig. 2) und eine sagittale A_1SB_1 . Die beiden Flächen würden jedoch nur unter der Voraussetzung zustande kommen, dass sich im Kreuzungspunkt der Strahlen eine unendlich enge Blende befindet. Bei weiter geöffneten Blenden, wie sie in der Praxis zur Anwendung kommen, spielen diese Flächen eine ganz untergeordnete optische Rolle; es machen sich jetzt vielmehr die Spitzen der Kaustiken mit ihren höheren Strahlenvereinigungen geltend. Die Annahme, dass die beiden astigmatischen Flächen ASB und A_1SB_1 Aufschluss über den Zustand des Bildes geben, ist mithin ganz willkürlich und ungerechtfertigt. Will man wirklich Einsicht in die Beschaffenheit des Bildes gewinnen, so gibt es nur einen Weg. Man darf zur Durchrechnung nicht beliebige Strahlen benutzen, sondern nur solche, die nach der Brechung durch die Spitzen der Kaustiken gehen, d. h. Fundamentalstrahlen. Damit ist aber gegeben, dass die

1. A. Gleichen, Vorlesungen über photographische Optik p. 146.

Lage der Blende jetzt nicht mehr willkürlich sein darf. Die Blende muss vielmehr an der Stelle stehen, an der die Fundamentalstrahlen die optische Achse schneiden. Diesen Punkt nennen wir nach Herrn Gleichen¹ „Mittelpunkt der natürlichen Blende“; er möge im folgendem mit dem Symbol [M. B.] bezeichnet werden.




Fig. 2

Die oben geschilderten Verhältnisse sollen noch an einem einfachen Beispiel² näher erläutert werden. In Fig. 3 denken wir uns eine Plankonvexlinse dargestellt, die dem Licht ihre plane Seite zuwendet. Unter endlicher Neigung zur optischen Achse $\parallel$ mögen parallele Strahlen auf die Linse fallen. Sie werden zunächst an der planen Fläche gebrochen, behalten aber die Eigenschaft bei, unter einander parallel zu sein. Die so gebrochenen Strahlen werden an der hinteren Linsenfläche, die den Krümmungs-

2. Das Beispiel ist mit Erlaubnis des Herrn Verfassers entnommen aus A. Gleichen, Vorlesungen über pho'ogr. Optik p. 144 u. ff.

mittelpunkt M hat, zum zweiten Male gebrochen. Beschränken wir uns auf den Hauptschnitt, so ist klar, dass derjenige Strahl Träger der kaustischen Spitze sein muss, der die Kugelfläche ungebrochen durchdringt, der also durch den Mittelpunkt M geht. Um den Fundamentalstrahl




Fig. 3

zu finden, brauchen wir also von allen auf die Linse fallenden Strahlen nur denjenigen zu ermitteln, der nach der Brechung an der Planfläche durch den Mittelpunkt M der zweiten brechenden Fläche geht. In Fig. 3 sei PC dieser Fundamentalstrahl, der also nach der Brechung in Richtung MD verläuft, wo $MD = r$ der Radius der zweiten durch S gehenden Linsenfläche ist.

Es sei: $MS = MD = r$, $AS = d$, $AB = x_1$, $AC = h$

$\sphericalangle ABC = u$, $\sphericalangle AMC = u'$

dann folgt aus Fig. 3

$$\operatorname{tg} u = \frac{h}{x_1}, \quad \operatorname{tg} u' = \frac{h}{r-d}$$

Also:
$$\frac{\operatorname{tgu}'}{\operatorname{tgu}} = \frac{x_1}{r-d}$$

Folglich:

$$x_1 = (r-d) \frac{\operatorname{tgu}'}{\operatorname{tgu}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

Nach dem Brechungsgesetz von Snellius ist nun

$$\sin u = n \sin u', \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

wenn n der Brechungsexponent der Linsensubstanz ist. Gleichung (2) kann man auch in der Form schreiben:

$$\operatorname{tgu}' = \frac{\sin u}{\sqrt{n^2 - \sin^2 u}}$$

Dann wird Gleichung (1):

$$x_1 = \frac{(r-d) \cos u}{\sqrt{n^2 - \sin^2 u}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

Ist also die Neigung der einfallenden Strahlen zur optischen Achse gegeben, so liefert Gleichung (3) die Entfernung des [M. B.] von der ersten brechenden Fläche. Unter Voraussetzung von Paraxialstrahlen geht Gleichung (3) über in:

$$x_1 = \frac{r-d}{n} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (4)$$

Zu bemerken ist noch, dass sich bei der Plankonvexlinse der Ort des [M. B.] für stärkere Strahlenneigungen nur wenig verschiebt¹, sodass auch für stärkere Neigungen Gleichung (4) zugrunde gelegt werden kann.

In den Figuren 4, 5, 6 ist nun der astigmatische Korrektionszustand derselben Plankonvexlinse graphisch dargestellt, wie er sich ergibt, wenn man verschiedene Achsenpunkte als Kreuzungspunkte für die Hauptstrahlen wählt.

Die Konstruktionsdaten für die Linse sind:

$$d = 8,6, \quad r = -51,79^3 \quad n = 1,5179.$$

Die Brennweite der Linse ist 100.

Aus Gleichung (4) ergibt sich als Entfernung des [M. B.]

$$x_1 = 28,454.$$

Fig. 4 zeigt den Fall, dass die Hauptstrahlen durch den [M. B.] gehen, zur Abbildung und trigonometrischen Durchrechnung also Fundamentalstrahlen benutzt sind. Es




Fig. 4

ergibt sich, wie es sein muss, ein von Astigmatismus freies Bild.

Fig. 5 zeigt den Fall, dass die Hauptstrahlen durch den Schnittpunkt der optischen Achse mit der Planfläche gehen. Es ergeben sich zwei Bildflächen, von denen die meridionale gestrichelt, die sagittale ausgezogen ist. Wie

3. Das Minuszeichen bedeutet, dass die Fläche ihre konkave Seite dem einfallenden Lichte zuwendet.

schon oben erwähnt, würden sich diese Flächen nur dann zeigen, wenn eine unendlich enge Blende benutzt werden würde. Jene Flächen repräsentieren nur eine Anzahl von Bildpunkten von ganz geringer Strahlenvereinigung, wie




Fig. 5

sie sich abseits von den Spitzen in der weiteren Ausdehnung der Kaustiken zeigen. Bei weiter geöffneten Blenden ist von diesen Flächen keine Spur vorhanden. Es machen sich dann vielmehr die Kaustiken mit ihrer höheren Strahlenvereinigung geltend.

Fig. 6 endlich zeigt den Fall, dass eine Hinterblende verwendet wird. Die Trennung der beiden astigmatischen Bildflächen ist noch stärker, und der wirkliche Sachverhalt bei weiter geöffneten Systemen ist nicht annähernd dargestellt.

Dieses geradezu klassische Beispiel wird die Bedeutung der Fundamentalstrahlen zur Genüge dartun, und man ist




Fig. 6

genötigt, die Ergebnisse der trigonometrischen Durchrechnung eines Systems mit willkürlich angenommenem Blendenort mit grösster Vorsicht aufzunehmen, insbesondere dann, wenn es sich um unsymmetrische Systeme handelt, während man bei symmetrischen Systemen, wie es schon früher geschah, den Symmetriepunkt als Blendenort wählen kann — wenigstens unter gewissen Bedingungen⁴, die aber in der Praxis meist erfüllt sind —, da bei symmetrischen Systemen der Symmetriepunkt annähernd mit dem [M. B.] übereinstimmt.

Aus Gleichung (3) geht hervor, dass im Falle einer Plankonvexlinse der Ort des [M. B.] abhängig ist von der Neigung der einfallenden Strahlen zur optischen Achse. Dasselbe muss man erwarten bei jedem beliebigen optischen System. Nur für den Fall, dass die Verschiebungen des [M. B.] innerhalb geringer Grenzen bleiben, kann die Theorie

4. Siehe Kap. III. § 4.

der natürlichen Blende Anspruch auf praktisches Interesse erheben.

Die allgemeine Entscheidung dieser Frage in Bezug auf ein beliebiges brechendes System muss infolge der unüberwindlichen mathematischen Schwierigkeiten unterbleiben; dagegen soll im folgenden die Aenderung der Lage des [M. B.] für den Fall einer halbkugelförmigen Konvexplanlinse festgestellt werden.

Kapitel 1.

Die natürliche Blende in Bezug auf eine halbkugelförmige
Konvexplanlinse unter Voraussetzung endlicher
Strahlenneigungen zur Achse.

§ 1. Die kaustische Kurve einer halbkugelförmigen Konvexplanlinse.

Man denke sich eine halbkugelförmige Linse — siehe Fig. 7 — so in einem rechtwinkligen Koordinatensystem gelegen, dass der Mittelpunkt des Grundkreises mit dem Koordinatenanfangspunkt O und die Projektion des Grundkreises mit der Y-Achse zusammenfällt. Die konvexe Seite der Linse sei der Lichtquelle zugewendet.

Ein Lichtstrahl, der mit der optischen Achse den Winkel φ bildet, möge die Linse in B treffen. Die Einfallsbzw. Brechungswinkel werden der Reihe nach mit i_1, i_1', i_2, i_2' bezeichnet. Bei C möge der gebrochene Strahl die Linse verlassen und jetzt mit der negativen X-Achse bei D den Winkel ψ bilden. Die Gleichung des zweimal gebrochenen Strahles CD ist dann:

$$y = -\operatorname{tg} \psi \cdot x + b_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (5)$$

wenn $b = OC$ ist.

Aus Fig. 7 folgt:

$$\psi = -i_2' \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

$$\frac{OC}{OB} = \frac{b}{r} = \frac{\sin i_1'}{\cos i_2}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

wenn r der Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche ist.




Fig. 7.

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (6) und (7) geht Gleichung (5) über in:

$$y - \operatorname{tg} i_2' \cdot x - \frac{r \cdot \sin i_1'}{\cos i_2} = 0.$$

Beachtet man jetzt, dass nach dem Brechungsgesetz von Snellius die Beziehung besteht:

$$\sin i_2' = n \cdot \sin i_2,$$

so wird die Gleichung des durch die Linse gebrochenen Strahles CD

$$y - \frac{n \cdot \sin i_2}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_2}} \cdot x - \frac{r \cdot \sin i_1'}{\cos i_2} = 0 \quad (8)$$

Fallen unendlich viele parallele Strahlen unter dem Winkel φ auf die Linse, so bilden alle diese Strahlen nach ihrer Brechung durch die Linse, sofern man nur die in der X-Y-Ebene verlaufenden Strahlen in Betracht zieht, eine kaustische Kurve. Mathematisch ist die kaustische Kurve identisch mit der Einhüllenden des gebrochenen Strahles CD (Gleichung 8), wenn man i_1' und i_2 als Parameter auffasst.

Die Ermittlung der Kaustik aus der Gleichung des gebrochenen Strahles kann auf sehr verschiedene Weise geschehen. Theoretisch ist es am einfachsten, einen Parameter z. B. i_2 fortzuschaffen, darauf die Gleichung nach dem andern Parameter i_1' zu differenzieren und aus der so erhaltenen und der ursprünglichen Gleichung den Parameter i_1' zu eliminieren.

Eine weitere Methode zur Berechnung der Kaustik ist die von Cayley⁵: „Enthält eine Kurve $U = 0$ zwei voneinander unabhängige Parameter α und β , so erhält man die Gleichung der Einhüllenden durch Elimination von α und β aus den Gleichungen:

$$U = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial \alpha} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial \beta} = 0. \quad ''$$

5. Salmon: Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven.

Bei der Anwendung dieser Methode geht man am zweckmässigsten aus von der Gleichung:

$$y - \frac{n \sin \left[\left(i_1 - \frac{\varphi}{2} \right) - \left(i_1' + \frac{\varphi}{2} \right) \right]}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 \left[\left(i_1 - \frac{\varphi}{2} \right) - \left(i_1' + \frac{\varphi}{2} \right) \right]}} x - \frac{r \cdot \sin \left[\left(i_1 - \frac{\varphi}{2} \right) - \left(i_1' + \frac{\varphi}{2} \right) \right]}{\cos \left[\left(i_1 - \frac{\varphi}{2} \right) - \left(i_1' + \frac{\varphi}{2} \right) \right]} = 0,$$

eine Gleichung, die sich aus Gleichung (8) unmittelbar ergibt, wenn man die Winkelbeziehungen der Fig. 7 berücksichtigt. Die beiden unabhängigen Parameter sind

$$i_1 - \frac{\varphi}{2} \text{ und } i_1' + \frac{\varphi}{2}.$$

Eine dritte Methode ist die der elliptischen Funktionen, die Heath⁶ auf den Fall anwendet, dass Lichtstrahlen parallel zur optischen Achse auf nur eine brechende Fläche fallen. Wendet man diese Methode auf die halbkugelförmige Linse an, so muss man ausgehen von der Gleichung:

$$y - \frac{n \cdot \sin(i_1 - i_1' - \varphi)}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2(i_1 - i_1' - \varphi)}} x - \frac{r \cdot \sin i_1'}{\cos(i_1 - i_1' - \varphi)} = 0,$$

eine Gleichung, die aus (8) unmittelbar folgt. Drückt man nun i_1 als elliptische Funktion aus, setzt also

$$i_1 = \operatorname{am} u,$$

so wird, wenn $K = \frac{1}{n}$ ist:

6. Heath, Lehrbuch der geometrischen Optik.

$$\begin{aligned}\sin i_1 &= \sin \text{am } u \\ \cos i_1 &= \cos \text{am } u \\ \sin i_1' &= K \cdot \sin \text{am } u \\ \cos i_1' &= \mathcal{A} \text{ am } u.\end{aligned}$$

Es ist jetzt also nur noch ein Parameter u in der Gleichung des gebrochenen Strahles vorhanden, und man muss also jetzt nach der ersten Methode fortfahren.

Eine wesentlich andere Methode wendet Cayley⁷ auf den Fall an, dass Licht von einem Punkt in endlicher Entfernung ausgehend an einem Kreise gebrochen wird. Er berechnet die sog. sekundäre Kaustik, d. i. die orthogonale Trajektion des gebrochenen Strahles. Die Evolute dieser sekundären Kaustik ist dann die primäre Kaustik.

Alle diese Methoden liefern sehr komplizierte Ausdrücke, die für eine spätere numerische Auswertung vollständig ungeeignet sind. Besonders kompliziert wurden die Ausdrücke bei Anwendung der Methode der elliptischen Funktionen. Verfasser erhielt im allgemeinen Fall, dass die einfallenden Lichtstrahlen einen endlichen Winkel mit der optischen Achse bilden, eine Gleichung von ca. 1500 Gliedern, während sich diese Methode zur Bestimmung der Kaustik für den Fall, dass das Licht parallel zur optischen Achse einfällt, noch gut bewährte. Im letzteren Fall erhielt Verfasser als Gleichung der Kaustik in Parameterform:

$$\frac{K \sin \text{am } u (\mathcal{A} \text{ am } u + K \cos \text{am } u) - y (\cos \text{am } u + K \mathcal{A} \text{ am } u)}{r \cos \text{am } u \cdot \mathcal{A} \text{ am } u (\cos \text{am } u + K \mathcal{A} \text{ am } u)^2 + r \cdot K \cdot K'^4 \sin^3 \text{am } u} =$$

$$\frac{c_1 - c_2 \sin^2 \text{am } u + 2K \cos \text{am } u \cdot \mathcal{A} \text{ am } u}{\sin^2 \text{am } u (\cos \text{am } u + K \mathcal{A} \text{ am } u) (c_2 \cos \text{am } u \mathcal{A} \text{ am } u + K K'^2)}$$

7. Memoire on Caustics, Phil. Trans. 1856.

$$\frac{y}{\sin \operatorname{am} u} + \frac{K'^2}{K(c_1 - c_2 \sin^2 \operatorname{am} u + 2K \cos \operatorname{am} u \mathcal{A} \operatorname{am} u)^{1/2}} x = \frac{r \cdot K (\mathcal{A} \operatorname{am} u + K \cos \operatorname{am} u)}{\cos \operatorname{am} u + K \mathcal{A} \operatorname{am} u}$$

Hierin ist:

$$K'^2 = 1 - K^2$$

$$c_1 = 1 + K^2$$

$$c_2 = 2K^2 + n^2 K'^4$$

Am einfachsten führt die Methode zum Ziel, die sich auf folgenden Satz⁵ gründet: „Enthält eine Kurve $U = 0$ die beiden Parameter p_1 und p_2 , die mittels der Gleichung $V = 0$ in Beziehung zu einander stehen, so bilde man die Determinante:

$$D = \begin{vmatrix} \frac{\partial U}{\partial p_1} & \frac{\partial U}{\partial p_2} \\ \frac{\partial V}{\partial p_1} & \frac{\partial V}{\partial p_2} \end{vmatrix}$$

Die Gleichung der Einhüllenden der Kurve $U = 0$ erhält man dann durch Elimination der Parameter p_1 und p_2 aus den Gleichungen:

$$U = 0$$

$$V = 0$$

$$D = 0."$$

Im vorliegenden Fall ist die Kurve $U = 0$ dargestellt durch die Gleichung (8).

Aus der Figur 7 folgt nun:

$$\chi = i_2 + i_1'$$

$$\chi = i_1 - \varphi$$

Folglich ergibt sich:

$$\sin (i_2 + i_1' + \varphi) = \sin i_1.$$

Nach dem Brechungsgesetz von Snellius ist:

$$\sin i_1 = n \cdot \sin i_1'.$$

Also folgt:

$$\sin(i_2 + i_1' + \varphi) - n \sin i_1' = 0, \quad . . . \quad (9)$$

eine Gleichung, die der Beziehung $V = 0$ entspricht. Schreibt man Gleichung (8) in der Form $U' = 0$ und Gleichung (9) in der Form $V' = 0$, so ergibt sich, da die beiden Parameter i_1' und i_2 sind:

$$D' = \begin{vmatrix} \frac{\partial U'}{\partial i_1'} & \frac{\partial U'}{\partial i_2'} \\ \frac{\partial V'}{\partial i_1'} & \frac{\partial V'}{\partial i_2} \end{vmatrix} = 0 \quad . . . \quad (10)$$

Es sollen nun die vier Ausdrücke $\frac{\partial U'}{\partial i_1'}$, $\frac{\partial U'}{\partial i_2}$, $\frac{\partial V'}{\partial i_1'}$, $\frac{\partial V'}{\partial i_2}$ berechnet werden:

Aus Gleichung (8) folgt nach einigen Umformungen:

$$\frac{\partial U'}{\partial i_1'} = - \frac{r \cdot \cos i_1'}{\cos i_2} \quad . . . \quad (11)$$

$$\frac{\partial U'}{\partial i_2} = - \frac{n \cdot x \cdot \cos i_2}{(1 - n^2 \sin^2 i_2)^{3/2}} - \frac{r \cdot \sin i_1' \sin i_2}{\cos^2 i_2} \quad . . \quad (12)$$

Ebenso folgt aus Gleichung (9)

$$\frac{\partial V'}{\partial i_1'} = \cos(i_2 + i_1' + \varphi) - n \cos i_1' \quad . . . \quad (13)$$

$$\frac{\partial V'}{\partial i_2} = \cos(i_2 + i_1' + \varphi) \quad . . . \quad (14)$$

Berücksichtigt man die Ausdrücke (11), (12), (13), (14), so nimmt Gleichung (6) nach einigen Umformungen die Gestalt an:

$$x_1 = - \frac{[r \cos(i_2 + i_1' + \varphi) \cos(i_2 + i_1')]}{n \cdot \cos^3 i_2 [n \cos i_1' - \cos(i_2 + i_1' + \varphi)]} \\ + \frac{r \cdot n \sin i_1' \cos i_1' \sin i_2 [1 - n^2 \sin^2 i_2]^{3/2}}{n \cdot \cos^3 i_2 [n \cos i_1' - \cos(i_2 + i_1' + \varphi)]}$$

Dafür kann man auch schreiben:

$$x_1 = - \{ r \cdot \cos(i_2 + i_1' + \varphi) \cos[(i_2 + i_1' + \varphi) - \varphi] \\ + n \cdot r \sin i_1' \cos i_1' \cdot \sin[(i_2 + i_1'' + \varphi) - (i_1' + \varphi)] \} \{ 1 - n^2 \sin^2[(i_2 + i_1' + \varphi) - (i_1' + \varphi)] \}^{3/2} : \\ n \cdot \cos^3[(i_2 + i_1' + \varphi) - (i_1' + \varphi)] [n \cos i_1' - \cos(i_2 + i_1' + \varphi)] \quad (15)$$

Nach Gleichung (9) ist:

$$\sin(i_2 + i_1' + \varphi) = n \sin i_1'$$

$$\text{und:} \quad \cos(i_2 + i_1' + \varphi) = \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'}$$

Setzt man diese Werte in (15) ein, so erhält man:

$$x = r \{ \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} [\sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \cos \varphi + n \sin i_1' \sin \varphi] \\ + n \sin i_1' \cos i_1' \cdot [n \sin i_1' \cos(i_1' + \varphi) \\ - \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \cdot \sin(i_1' + \varphi)] \} \{ 1 - n^2 [n \sin i_1' \cos(i_1' + \varphi) \\ - \sin(i_1' + \varphi) \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'}] \}^{3/2} : \\ n [\sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \cdot \cos(i_1' + \varphi) + n \sin^2 i_1' \sin(i_1' + \varphi)]^3 \quad (16) \\ [n \cos i_1' - \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'}]$$

Aus Gleichung (8) folgt nach einigen Umformungen

$$y = \frac{r \cdot \sin i_1'}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \cos(i_1' + \varphi) + n \sin i_1' \sin(i_1' + \varphi)} \quad (17)$$

$$- \frac{n [n \sin i_1' \cdot \cos(i_1' + \varphi) - \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \cdot \sin(i_1' + \varphi)]}{\sqrt{1 - n^2 [n \sin i_1' \cos(i_1' + \varphi) - \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i_1'} \sin(i_1' + \varphi)]^2}} x,$$

wo x die Bedeutung (16) hat.

Auf eine Elimination des zweiten Parameters i_1' muss verzichtet werden, da hierdurch die Ausdrücke zu kompliziert werden. Die Gleichungen (16) und (17) stellen dann also die kaustische Kurve in Parameterform dar.

§ 2. Bedingungen für die Spitze der Kaustik.

Für die Spitze der Kaustik muss offenbar x ein Maximum sein, d. h. es muss sein:

$$\frac{dx}{dy} = 0,$$

oder da die Kaustik in Parameterform dargestellt ist:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\frac{dx}{di_1'}}{\frac{dy}{di_1'}} = 0.$$

Diese Bedingung ist dann erfüllt, wenn

$$\frac{dx}{di_1'} = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (18)$$

ist, sodass also Gleichung (18) die Bedingung für eine Spitze der Kaustik darstellt.

In dem Ausdruck (16) setze man zur Abkürzung:

$$\begin{aligned} f_1 = & \sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'} [\sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'} \cdot \cos \varphi + n \cdot \sin \varphi \sin i_1'] \\ & + n \sin i_1' \cos i_1' [n \sin i_1' \cos (i_1' + \varphi) \\ & - \sin (i_1' + \varphi) \sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'}] \quad (19) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2 = & 1-n^2 [n \sin i_1' \cdot \cos (i_1' + \varphi) \\ & - \sin (i_1' + \varphi) \sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'}]^2 \quad (20) \end{aligned}$$

$$f_3 = \sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'} \cdot \cos (i_1' + \varphi) + n \sin i_1' \sin (i_1' + \varphi) \quad (21)$$

$$f_4 = n \cos i_1' - \sqrt{1-n^2 \sin^2 i_1'} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (22)$$

nur abhängig vom Einfallswinkel an der ersten Linsenfläche, dagegen unabhängig von allen andern Einfalls- und Brechungswinkeln und auch unabhängig vom Krümmungsradius r der vorderen Linsenfläche.“

Es sollen jetzt die einzelnen Grössen f umgeformt werden. Da in ihnen nur noch der eine Winkel i_1' vorkommt, kann man, ohne sich der Gefahr einer Verwechslung auszusetzen, den Index fortlassen, sodass also ist:

$$i = i_1' \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (26)$$

Ferner setze man

$$\left. \begin{aligned} c_1 &= \sin \varphi \\ c_2 &= \cos \varphi \end{aligned} \right\} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (27)$$

Nach einigen Umformungen erhält man aus (19):

$$\begin{aligned} f_1 &= c_2 - n^2 c_1 \sin^4 i - n^2 c_1 \sin^3 i \cos i \\ &\quad + \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} [-n c_2 \sin^2 i \cdot \cos i + n c_1 \sin^3 i] \end{aligned} \quad (28)$$

Aus dieser Gleichung ergibt sich, wenn man setzt:

$$\alpha_1 = 3n^3 c_2 + 3n c_2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (29)$$

$$\begin{aligned} f_1' &= \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} [-4n^2 c_2 \sin^3 i \cos i - 3n^2 c_1 \sin^2 i + 4n^2 c_1 \sin^4 i] \\ &\quad + \alpha_1 \sin^3 i - 4n^3 c_2 \sin^5 i - 4n^3 c_1 \sin^4 i \cos i - 2n c_2 \sin i + \\ &\quad \quad \quad 3n c_1 \sin^2 i \cos i]: \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (30) \\ &\quad \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} \end{aligned}$$

Führt man die Grössen ein:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_2 &= 1 - n^2 c_1^2 & \alpha_3 &= 2n^4 c_2^2 - 2n^4 c_1^2 \\ \alpha_4 &= -n^4 c_2^2 - n^2 c_2^2 + n^2 c_1^2 + n^4 c_1^2 & \alpha_5 &= -2n^3 c_1^2 + 2n^3 c_2^2 \end{aligned} \right\} \quad . \quad (31)$$

so erhält man aus (20) nach einigen Transformationen:

$$\begin{aligned} f_2 = & \alpha_2 + \alpha_3 \cdot \sin^4 i + \alpha_4 \sin^2 i - 2n^2 c_1 c_2 \sin i \cdot \cos i \\ & + 4n^4 c_1 c_2 \sin^3 i \cos i + \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [-4n^3 c_1 c_2 \sin^3 i \\ & + \alpha_5 \sin^2 i \cos i + 2n^3 c_1 c_2 \sin i] \quad . \quad . \quad . \quad (32) \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich, wenn man setzt:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_6 &= 2n^2 c_1 c_2 + 6n^4 c_1 c_2 \\ \alpha_7 &= 3n^5 c_1^2 - 3n^5 c_2^2 + 3n^3 c_1^2 - 3n^3 c_2^2 \\ \alpha_8 &= -2n^5 c_1 c_2 - 6n^3 c_1 c_2 \end{aligned} \right\} . \quad (33)$$

$$\begin{aligned} f_2' = & 2 \{ \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [2\alpha_3 \sin^3 i \cos i + \alpha_4 \sin i \cdot \cos i - n^2 c_1 c_2 \\ & + \alpha_6 \sin^2 i - 8n^4 c_1 c_2 \sin^4 i] + 8n^5 c_1 c_2 \sin^4 i \cos i + \alpha_7 \sin^3 i \\ & + 2n^2 \alpha_5 \sin^5 i + \alpha_8 \sin^2 i \cos i + \alpha_5 \sin i + n^3 c_1 c_2 \cos i \} : \\ & \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (34) \end{aligned}$$

Aus (21) folgt:

$$\begin{aligned} f_3 = & n c_2 \sin^2 i + n c_1 \sin i \cdot \cos i + \\ & \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [c_2 \cos i - c_1 \sin i] \quad (35) \end{aligned}$$

Setzt man:

$$\alpha_9 = -n^2 c_2 - c_2, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (36)$$

so folgt aus (35):

$$\begin{aligned} f_3' = & \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [2n c_2 \sin i \cos i + n c_1 - 2n c_1 \sin^2 i] \\ & + \alpha_9 \sin i + 2n^2 c_2 \sin^3 i + 2n^2 c_1 \sin^2 i \cos i - c_1 \cos i : \\ & \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (37) \end{aligned}$$

Aus (22) folgt:

$$f_4' = n^2 \sin i \cdot \cos i - n \sin i \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} : \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} \quad (38)$$

Aus (22) und (35) folgt nach einigen Umformungen, wenn man setzt:

$$\alpha_{10} = n^2 c_1 + c_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (39)$$

$$\begin{aligned} f_3 \cdot f_4 &= 2n^2 c_2 \sin^2 i \cdot \cos i + \alpha_{10} \sin i - 2n^2 c_1 \sin^3 i \\ &+ \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} [n c_2 - 2n c_2 \sin^2 i - 2n c_1 \sin i \cos i] \quad . \quad (40) \end{aligned}$$

Man führe zur Abkürzung folgende Grössen ein:

$$\left. \begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \alpha_2 - 5n c_2 \alpha_4 - 9n^3 c_1^2 c_2 - 9n^5 c_1^2 c_2 + 3c_2 \alpha_7 \\ \beta_2 &= -4n^3 c_2 \alpha_2 - 8n c_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_4 + 46n^5 c_1^2 c_2 \\ &\quad + 6n^3 c_1^2 c_2 - n^2 c_2 \alpha_5 + 6n^7 c_1^2 c_2 - 3n^2 c_1 \alpha_8 \\ &\quad + 3n c_2 \alpha_4 + 3n c_1 \alpha_6 + 3n^3 c_2 \alpha_4 \\ \beta_3 &= -4n^3 c_1 \alpha_2 + 6n c_1 \alpha_4 - 2n^2 c_1 c_2 \alpha_1 \\ &\quad + 2n^5 c_1 c_2^2 - 6n^2 c_1 \alpha_5 - 3n c_2 \alpha_6 \\ \beta_4 &= -2n c_2 \alpha_2 + 3 c_2 \alpha_5 \\ \beta_5 &= 3n c_1 \alpha_2 + 7n^3 c_1 c_2^2 + 3 c_2 \alpha_8 \\ \beta_6 &= \alpha_1 \alpha_3 - 7n^3 c_2 \alpha_4 - 60n^5 c_1^2 c_2 - 60n^7 c_1^2 c_2 \\ &\quad + 4n^2 c_2 \alpha_5 + 4n^4 c_2 \alpha_5 - 3n^2 c_2 \alpha_7 + 3n^2 c_1 \alpha_8 + 6n c_2 \alpha_3 \\ &\quad + 6n^3 c_2 \alpha_3 - 3n^3 c_1 \alpha_6 \\ \beta_7 &= -10n^3 c_2 \alpha_3 + 80n^7 c_1^2 c_2 - 10n^4 c_2 \alpha_5 \\ \beta_8 &= -10n^3 c_1 \alpha_3 - 80n^7 c_1 c_2^2 - 10n^4 c_1 \alpha_5 \\ \beta_9 &= 9n c_1 \alpha_3 - 7n^3 c_1 \alpha_4 + 48n^5 c_1 c_2^2 + 4n^4 c_1 c_2 \alpha_1 \\ &\quad + 4n^2 c_1 \alpha_5 + 3n^4 c_1 \alpha_5 + 8n^7 c_1 c_2^2 - 3n^2 c_2 \alpha_8 \\ &\quad - 3n^2 c_1 \alpha_8 + 3n^3 c_2 \alpha_6 \\ \beta_{10} &= 3n^3 c_1 c_2^2 \\ \beta_{11} &= -4n^2 c_2 \alpha_2 + 18n^4 c_1^2 c_2 - 5n c_2 \alpha_5 + 6 c_2 \alpha_3 \\ \beta_{12} &= -3n^2 c_1 \alpha_2 - 7n^4 c_1 c_2^2 + 3 c_2 \alpha_6 \\ \beta_{13} &= 4n^2 c_1 \alpha_2 - 6n^2 c_1 \alpha_4 - 2n^4 c_1 c_2^2 + 6n c_1 \alpha_5 \\ &\quad + 2n^3 c_1 c_2 \alpha_1 - 3n c_2 \alpha_8 \\ \beta_{14} &= -10n^2 c_2 \alpha_3 + 80n^6 c_1^2 c_2 - 10n^3 c_2 \alpha_5 \\ \beta_{15} &= -9n^2 c_1 \alpha_3 + 7n^2 c_1 \alpha_4 - 8n^4 c_1 c_2^2 - 48n^6 c_1 c_2^2 \\ &\quad - 4n^3 c_1 c_2 \alpha_1 - 4n^3 c_1 \alpha_5 - 3n c_1 \alpha_5 + 3n c_2 \alpha_8 \\ &\quad + 3n c_1 \alpha_7 - 3n^2 c_2 \alpha_6 \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

$$\left. \begin{aligned} \beta_{16} &= 10n^2 c_1 \alpha_3 + 80n^6 c_1 c_2^2 + 10n^3 c_1 \alpha_5 \\ \beta_{17} &= -7n^2 c_2 \alpha_4 - 20n^4 c_1^2 c_2 - 20n^6 c_1^2 c_2 \\ &\quad + \alpha_1 \alpha_5 - 3n c_2 \alpha_7 + 3n c_1 \alpha_8 - 3n^2 c_1 \alpha_6 \\ \beta_{18} &= 2c_2 \alpha_4 \\ \beta_{19} &= -3n^2 c_1 c_2^2 \end{aligned} \right\} (41)$$

Aus den Gleichungen (28), (30), (32), (34) ergibt sich dann nach längeren Umformungen:

$$\left. \begin{aligned} f_1' f_2 + \frac{3}{2} f_1 f_2' &= [\beta_1 \sin^3 i + \beta_2 \sin^5 i + \beta_3 \sin^4 i \cos i \\ &\quad + \beta_4 \sin i + \beta_5 \sin^2 i \cos i + \beta_6 \sin^7 i + \beta_7 \sin^9 i \\ &\quad + \beta_8 \sin^8 i \cos i + \beta_9 \sin^6 i \cos i + \beta_{10} \cos i] \\ &\quad + \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [\beta_{11} \sin^3 i \cos i + \beta_{12} \sin^2 i + \beta_{13} \sin^4 i \\ &\quad + \beta_{14} \sin^7 i \cos i + \beta_{15} \sin^6 i + \beta_{16} \sin^8 i + \beta_{17} \sin^5 i \cos i \\ &\quad + \beta_{18} \sin i \cos i + \beta_{19}] : \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} \end{aligned} \right\} (42)$$

Man führe ferner folgende Grössen ein:

$$\left. \begin{aligned} \gamma_1 &= c_2 \alpha_2 \\ \gamma_2 &= c_2 \alpha_3 - n^2 c_2 \alpha_2 + 4n^4 c_1^2 c_2 - n c_2 \alpha_5 \\ \gamma_3 &= c_2 \alpha_4 \\ \gamma_4 &= -2n^2 c_1 c_2^2 \\ \gamma_5 &= 2n^4 c_1 c_2^2 - n^2 c_1 \alpha_2 \\ \gamma_6 &= -n^2 c_2 \alpha_3 + 8n^6 c_1^2 c_2 - n^3 c_2 \alpha_5 \\ \gamma_7 &= -n^2 c_2 \alpha_4 - 6n^4 c_1^2 c_2 - 6n^6 c_1^2 c_2 \\ &\quad + n c_2 \alpha_5 + n^3 c_2 \alpha_5 \\ \gamma_8 &= 6n^4 c_1 c_2^2 - n^2 c_1 \alpha_4 + n c_1 \alpha_5 + 2n^6 c_1 c_2^2 \\ \gamma_9 &= -8n^6 c_1 c_2^2 - n^2 c_1 \alpha_3 - n^3 c_1 \alpha_5 \\ \gamma_{10} &= -2n^3 c_1 c_2^2 + n c_1 \alpha_2 \\ \gamma_{11} &= c_2 \alpha_5 - n c_2 \alpha_2 \\ \gamma_{12} &= 2n^3 c_1 c_2^2 \\ \gamma_{13} &= 8n^5 c_1 c_2^2 + n^2 c_1 \alpha_5 + n c_1 \alpha_3 \\ \gamma_{14} &= -n^2 c_2 \alpha_5 + 8n^5 c_1^2 c_2 - n c_2 \alpha_3 \\ \gamma_{15} &= -6n^5 c_1 c_2^2 - n^2 c_1 \alpha_5 - 2n^3 c_1 c_2^2 + n c_1 \alpha_4 \\ \gamma_{16} &= -2n^5 c_1^2 c_2 - n c_2 \alpha_4 - 2n^3 c_1^2 c_2 \end{aligned} \right\} (43)$$

Dann folgt aus (19) und (20):

$$\begin{aligned}
 f_1 f_2 = & [\gamma_1 + \gamma_2 \sin^4 i + \gamma_3 \sin^2 i + \gamma_4 \sin i \cdot \cos i \\
 & + \gamma_5 \sin^3 i \cos i + \gamma_6 \sin^8 i + \gamma_7 \sin^6 i + \gamma_8 \sin^5 i \cos i \\
 & + \gamma_9 \sin^7 i \cos i] + \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} [\gamma_{10} \sin^3 i + \gamma_{11} \sin^2 i \cos i \\
 & + \gamma_{12} \sin i + \gamma_{13} \sin^7 i + \gamma_{14} \sin^6 i \cos i \\
 & + \gamma_{15} \sin^5 i + \gamma_{16} \sin^4 i \cdot \cos i] \quad . \quad . \quad . \quad (44)
 \end{aligned}$$

Man setze:

$$\left. \begin{aligned}
 \delta_1 &= 3n^2 \alpha_9 - 7n c_2 & \delta_6 &= 7n^2 c_2 - 3\alpha_9 \\
 \delta_2 &= 14n^3 c_2 & \delta_7 &= 14n^2 c_2 \\
 \delta_3 &= 10n^3 c_1 + 10n c_1 & \delta_8 &= -14n^2 c_1 \\
 \delta_4 &= -14n^3 c_1 & \delta_9 &= 3n^2 c_1 + 3c_1 \\
 \delta_5 &= -6n c_2
 \end{aligned} \right\} (45)$$

Man erhält aus (21), (22), (37), (38):

$$\begin{aligned}
 3f_3' f_4 + f_3 f_4' = & \{[\delta_1 \sin i \cos i + \delta_2 \sin^3 i \cos i + \delta_3 \sin^2 i \\
 & + \delta_4 \sin^4 i + \delta_5] + \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} [\delta_6 \sin i + \delta_7 \sin^3 i \\
 & + \delta_8 \sin^2 i \cos i + \delta_9 \cos i]\} : \sqrt{1 - n^2 \sin^2 i} \quad (46)
 \end{aligned}$$

Man setze:

$$\left. \begin{aligned}
 \varepsilon_1 &= 2n^2 c_2 \beta_1 + \alpha_{10} \beta_3 - 2n^2 c_1 \beta_5 + n c_2 \beta_{17} - 2n c_2 \beta_{11} \\
 &\quad - 2n c_1 \beta_{13} - n^3 c_2 \beta_{11} + 2n^3 c_2 \beta_{18} + 2n^3 c_1 \beta_{12} - \delta_1 \gamma_2 \\
 &\quad - \delta_2 \gamma_3 - \delta_3 \gamma_5 - \delta_4 \gamma_4 - \delta_5 \gamma_8 - \delta_6 \gamma_{16} - \delta_7 \gamma_{11} - \delta_8 \gamma_{10} \\
 &\quad - \delta_9 \gamma_{15} + n^2 \delta_6 \gamma_{11} + n^2 \delta_8 \gamma_{12} + n^2 \delta_9 \gamma_{10} \\
 \varepsilon_2 &= 2n^2 c_2 \beta_2 + \alpha_{10} \beta_9 - 2n^2 c_1 \beta_3 + n c_2 \beta_{14} - 2n c_2 \beta_{17} \\
 &\quad - 2n c_1 \beta_{15} - n^3 c_2 \beta_{17} + 2n^3 c_2 \beta_{11} + 2n^3 c_1 \beta_{13} - \delta_1 \gamma_7 \\
 &\quad - \delta_2 \gamma_2 - \delta_3 \gamma_8 - \delta_4 \gamma_5 - \delta_5 \gamma_4 - \delta_6 \gamma_{14} - \delta_7 \gamma_{16} + \delta_8 \gamma_{15} \\
 &\quad - \delta_9 \gamma_{13} + n^2 \delta_6 \gamma_{16} + n^2 \delta_7 \gamma_{11} + n^2 \delta_8 \gamma_{11} + n^2 \delta_9 \gamma_{15} \\
 \varepsilon_3 &= 2n^2 c_2 \beta_3 - 2n^2 c_2 \beta_5 + \alpha_{10} \beta_2 - 2n^2 c_1 \beta_1 + n c_2 \beta_{15}
 \end{aligned} \right\} (47)$$

$$\begin{aligned}
 & -2nc_2\beta_{13} + 2nc_1\beta_{11} - 2nc_1\beta_{17} - n^3c_2\beta_{13} + 2n^3c_2\beta_{12} \\
 & + 2n^3c_1\beta_{11} - 2n^3c_1\beta_{18} + \delta_1\gamma_{25} - \delta_1\gamma_8 + \delta_2\gamma_4 - \delta_2\gamma_5 \\
 & - \delta_3\gamma_2 - \delta_4\gamma_3 - \delta_5\gamma_7 - \delta_6\gamma_{15} - \delta_7\gamma_{10} - \delta_8\gamma_{11} - \delta_8\gamma_{16} \\
 & - \delta_9\gamma_{14} + \delta_9\gamma_{16} + n^2\delta_6\gamma_{10} + n^2\delta_7\gamma_{12} + n^2\delta_8\gamma_{11} \\
 & - n^2\delta_9\gamma_{11} - n^2\delta_9\gamma_{16} \\
 \varepsilon_4 = & -2n^2c_2\beta_3 + 2n^2c_2\beta_9 + \alpha_{10}\beta_6 - 2n^2c_1\beta_2 + nc_2\beta_{16} \\
 & - 2nc_2\beta_{15} - 2nc_1\beta_{14} + 2nc_1\beta_{17} - n^3c_2\beta_{15} + 2n^3c_2\beta_{13} \\
 & - 2n^3c_1\beta_{11} + 2n^3c_1\beta_{17} + \delta_1\gamma_8 - \delta_1\gamma_9 + \delta_2\gamma_5 - \delta_2\gamma_8 \\
 & - \delta_3\gamma_7 - \delta_4\gamma_2 - \delta_5\gamma_6 - \delta_6\gamma_{13} - \delta_7\gamma_{15} - \delta_8\gamma_{14} + \delta_8\gamma_{16} \\
 & + \delta_9\gamma_{14} + n^2\delta_6\gamma_{15} + n^2\delta_7\gamma_{10} - n^2\delta_8\gamma_{11} + n^2\delta_8\gamma_{16} \\
 & + n^2\delta_9\gamma_{14} - n^2\delta_9\gamma_{16} \\
 \varepsilon = & 2n^2c_2\beta_4 + \alpha_{10}\beta_5 - 2n^2c_1\beta_{10} + nc_2\beta_{11} - 2nc_2\beta_{18} \\
 & - 2nc_1\beta_{12} - n^3c_2\beta_{18} + 2n^3c_1\beta_{19} - \delta_1\gamma_3 - \delta_2\gamma_1 - \delta_3\gamma_4 \\
 & - \delta_5\gamma_5 - \delta_6\gamma_{11} - \delta_8\gamma_{12} - \delta_9\gamma_{10} + n^2\delta_9\gamma_{12} \\
 \varepsilon_6 = & 2n^2c_2\beta_5 - 2n^2c_2\beta_{10} + \alpha_{10}\beta_1 - 2n^2c_1\beta_4 + nc_2\beta_{13} \\
 & - 2nc_2\beta_{12} - 2nc_1\beta_{11} + 2nc_1\beta_{18} - n^3c_2\beta_{12} + 2n^3c_2\beta_{19} \\
 & + 2n^3c_1\beta_{18} + \delta_1\gamma_4 - \delta_1\gamma_5 - \delta_2\gamma_4 - \delta_3\gamma_3 - \delta_4\gamma_1 - \delta_5\gamma_2 \\
 & - \delta_6\gamma_{10} - \delta_7\gamma_{12} - \delta_8\gamma_{11} - \delta_9\gamma_{11} - \delta_9\gamma_{16} + n^2\delta_6\gamma_{12} \\
 & + n^2\delta_9\gamma_{11} \\
 \varepsilon_7 = & 2n^2c_2\beta_6 + \alpha_{10}\beta_8 - 2n^2c_1\beta_9 - 2nc_2\beta_{14} - 2nc_1\beta_{16} \\
 & - n^3c_2\beta_{14} + 2n^3c_2\beta_{17} + 2n^3c_1\beta_{15} - \delta_1\gamma_6 - \delta_2\gamma_7 - \delta_3\gamma_9 \\
 & - \delta_4\gamma_8 - \delta_7\gamma_{14} - \delta_8\gamma_{13} + n^2\delta_6\gamma_{14} + n^2\delta_7\gamma_{16} + n^2\delta_8\gamma_{15} \\
 & + n^2\delta_9\gamma_{13} \\
 \varepsilon_8 = & 2n^2c_2\beta_7 - 2n^2c_1\beta_8 + 2n^3c_2\beta_{14} + 2n^3c_1\beta_{16} - \delta_2\gamma_6 \\
 & - \delta_4\gamma_9 + n^2\delta_7\gamma_{14} + n^2\delta_8\gamma_{13} \\
 \varepsilon_9 = & 2n^2c_2\beta_8 - 2n^2c_2\beta_9 + \alpha_{10}\beta_7 - 2n^2c_1\beta_6 - 2n^2c_2\beta_{16} \\
 & + 2nc_1\beta_{14} + n^3c_2\beta_{16} + 2n^3c_2\beta_{15} + 2n^3c_1\beta_{14} - 2n^3c_1\beta_{17} \\
 & + \delta_1\gamma_9 + \delta_2\gamma_8 + \delta_2\gamma_9 + \delta_3\gamma_6 - \delta_4\gamma_7 - \delta_7\gamma_{13} + \delta_8\gamma_{14} \\
 & + n^2\delta_6\gamma_{13} + n^2\delta_7\gamma_{15} + n^2\delta_8\gamma_{14} - n^2\delta_8\gamma_{16} + n^2\delta_9\gamma_{14} \\
 \varepsilon_{10} = & -2n^2c_2\beta_8 - 2n^2c_1\beta_7 + 2n^3c_2\beta_{16} \\
 & - 2n^3c_1\beta_{14} + \delta_2\gamma_9 - \delta_4\gamma_6 + n^2\delta_7\gamma_{13} - n^2\delta_8\gamma_{14} \\
 \varepsilon_{11} = & 2n^2c_2\beta_{10} + \alpha_{10}\beta_4 + nc_2\beta_{12} - 2nc_2\beta_{19} - 2nc_1\beta_{18} \\
 & n^3c_2\beta_{19} - \delta_1\gamma_4 - \delta_3\gamma_1 - \delta_5\gamma_3 - \delta_6\gamma_{12} - \delta_9\gamma_{11} \\
 \varepsilon_{12} = & \alpha_{10}\beta_{10} + nc_2\beta_{18} - 2nc_1\beta_{19} - \delta_1\gamma_1 - \delta_5\gamma_4 - \delta_9\gamma_{12} \\
 \varepsilon_{13} = & nc_2\beta_{19} - \delta_5\gamma_1
 \end{aligned} \tag{47}$$

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{14} &= 2n^2c_2\beta_{11} - 2n^2c_2\beta_{18} + \alpha_{10}\beta_{13} - 2n^2c_1\beta_{12} + nc_2\beta_2 \\
 &\quad - 2nc_2\beta_1 - 2nc_1\beta_3 + 2nc_1\beta_5 - \delta_6\gamma_2 - \delta_7\gamma_3 + \delta_8\gamma_4 \\
 &\quad - \delta_8\gamma_5 + \delta_9\gamma_5 - \delta_9\gamma_8 + \delta_1\gamma_{11} - \delta_1\gamma_{16} - \delta_2\gamma_{11} - \delta_3\gamma_{10} \\
 &\quad - \delta_4\gamma_{12} - \delta_5\gamma_{15} \\
 \varepsilon_{15} &= -2n^2c_2\beta_{11} + 2n^2c_2\beta_{17} + \alpha_{10}\beta_{15} - 2n^2c_1\beta_{13} + nc_2\beta_6 \\
 &\quad - 2nc_2\beta_2 + 2nc_1\beta_3 - 2nc_1\beta_9 - \delta_6\gamma_7 - \delta_7\gamma_2 + \delta_8\gamma_5 \\
 &\quad - \delta_8\gamma_8 + \delta_9\gamma_8 - \delta_9\gamma_9 - \delta_1\gamma_{14} + \delta_1\gamma_{16} + \delta_2\gamma_{11} - \delta_2\gamma_{16} \\
 &\quad - \delta_3\gamma_1 - \delta_4\gamma_{10} - \delta_5\gamma_{13} \\
 \varepsilon_{16} &= 2n^2c_2\beta_{12} + \alpha_{10}\beta_{11} - 2n^2c_1\beta_{18} + nc_2\beta_3 - 2nc_2\beta_5 \\
 &\quad - 2nc_1\beta_1 - \delta_6\gamma_5 - \delta_7\gamma_4 - \delta_8\gamma_3 - \delta_9\gamma_2 - \delta_1\gamma_{10} - \delta_2\gamma_{12} \\
 &\quad - \delta_3\gamma_{11} - \delta_5\gamma_{16} \\
 \varepsilon_{17} &= 2n^2c_2\beta_{13} + \alpha_{10}\beta_{17} - 2n^2c_1\beta_{11} + nc_2\beta_9 - 2nc_2\beta_3 \\
 &\quad - 2nc_1\beta_2 - \delta_6\gamma_8 - \delta_7\gamma_5 - \delta_8\gamma_2 - \delta_8\gamma_7 - \delta_1\gamma_{15} - \delta_2\gamma_{10} \\
 &\quad - \delta_3\gamma_{16} - \delta_4\gamma_{11} - \delta_5\gamma_{14} \\
 \varepsilon_{18} &= 2n^2c_2\beta_{14} - 2n^2c_2\beta_{17} + \alpha_{10}\beta_{16} - 2n^2c_1\beta_{15} + nc_2\beta_7 \\
 &\quad - 2nc_2\beta_6 - 2nc_1\beta_8 - 2nc_1\beta_9 - \delta_6\gamma_6 - \delta_7\gamma_7 + \delta_8\gamma_8 \\
 &\quad - \delta_8\gamma_9 + \delta_9\gamma_9 + \delta_1\gamma_{14} - \delta_2\gamma_{14} + \delta_2\gamma_{16} - \delta_3\gamma_{13} - \delta_4\gamma_{15} \\
 \varepsilon_{19} &= -2n^2c_2\beta_{14} - 2n^2c_1\beta_{16} - 2nc_2\beta_7 + 2nc_1\gamma_8 - \delta_7\gamma_6 \\
 &\quad + \delta_8\gamma_9 + \delta_2\gamma_{14} - \delta_4\gamma_{13} \\
 \varepsilon_{20} &= 2n^2c_2\beta_{15} + \alpha_{10}\beta_{15} - 2n^2c_1\beta_{17} + nc_2\beta_8 - 2nc_2\beta_9 \\
 &\quad - 2nc_1\beta_6 - \delta_6\gamma_9 - \delta_7\gamma_8 - \delta_8\gamma_7 - \delta_9\gamma_6 - \delta_1\gamma_{13} - \delta_2\gamma_{15} \\
 &\quad - \delta_3\gamma_{14} - \delta_4\gamma_{16} \\
 \varepsilon_{21} &= 2n^2c_2\beta_{16} - 2n^2c_1\beta_{14} - 2nc_2\beta_8 - 2nc_1\beta_7 - \delta_7\gamma_9 \\
 &\quad - \delta_8\gamma_6 - \delta_2\gamma_{13} - \delta_4\gamma_{14} \\
 \varepsilon_{22} &= 2n^2c_2\beta_{18} + \alpha_{10}\beta_{12} - 2n^2c_1\beta_{19} + nc_2\beta_1 - 2nc_2\beta_4 \\
 &\quad - 2nc_1\beta_5 + 2nc_1\beta_{10} - \delta_6\gamma_3 - \delta_7\gamma_1 - \delta_8\gamma_4 + \delta_9\gamma_4 \\
 &\quad - \delta_9\gamma_5 - \delta_1\gamma_{11} - \delta_3\gamma_{12} - \delta_5\gamma_{10} \\
 \varepsilon_{23} &= 2n^2c_2\beta_{19} + \alpha_{10}\beta_{18} + nc_2\beta_5 - 2nc_2\beta_{10} - 2nc_1\beta_4 \\
 &\quad - \delta_6\gamma_4 - \delta_8\gamma_1 - \delta_9\gamma_3 - \delta_1\gamma_{12} - \delta_5\gamma_{11} \\
 \varepsilon_{24} &= \alpha_{10}\beta_{19} + nc_2\beta_4 - 2nc_1\beta_{10} - \delta_6\gamma_1 - \delta_9\gamma_4 - \delta_5\gamma_{12} \\
 \varepsilon_{25} &= nc_2\beta_{10} - \delta_9\gamma_1
 \end{aligned} \tag{47}$$

Setzt man in (25) die Werte von (40), (42), (44), (46) ein, so erhält man nach Unterdrückung des Faktors

$$\frac{1}{\sqrt{1-n^2 \sin^2 i}}$$

wenn man (47) berücksichtigt als Bedingung für die Spitze der Kaustik:

$$\begin{aligned} & \varepsilon_1 \sin^5 i \cdot \cos i + \varepsilon_2 \sin^7 i \cos i + \varepsilon_3 \sin^6 i + \varepsilon_4 \sin^8 i \\ & + \varepsilon_5 \sin^3 i \cos i + \varepsilon_6 \sin^4 i + \varepsilon_7 \sin^9 i \cos i + \varepsilon_8 \sin^{11} i \cos i \\ & + \varepsilon_9 \sin^{10} i + \varepsilon_{10} \sin^{12} i + \varepsilon_{11} \sin^2 i + \varepsilon_{12} \sin i \cos i + \varepsilon_{13} \\ & + \sqrt{1-n^2 \sin^2 i} [\varepsilon_{14} \sin^5 i + \varepsilon_{15} \sin^7 i + \varepsilon_{16} \sin^4 i \cos i \\ & + \varepsilon_{17} \sin^6 i \cos i + \varepsilon_{18} \sin^9 i + \varepsilon_{19} \sin^{11} i + \varepsilon_{20} \sin^8 i \cos i \\ & + \varepsilon_{21} \sin^{10} i \cos i + \varepsilon_{22} \sin^3 i + \varepsilon_{23} \sin^2 i \cos i \\ & + \varepsilon_{24} \sin i + \varepsilon_{25} \cos i] = 0 \end{aligned} \quad (48)$$

Man führe foldende Grössen ein:

$$\begin{aligned} \zeta_1 &= \varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_1 \varepsilon_5 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_5 - 2\varepsilon_2 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_3 \varepsilon_6 + 2\varepsilon_4 \varepsilon_{11} \\ &+ 2\varepsilon_7 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_9 \varepsilon_{13} - \varepsilon_{14}^2 + \varepsilon_{16}^2 - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{22} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{17} \\ &+ 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{23} - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{24} - 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{23} + 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{25} \\ &+ 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{22} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{24} - 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{23} \\ &- 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{25} + n^2 \varepsilon_{16}^2 \\ \zeta_2 &= -\varepsilon_1^2 + \varepsilon_3^2 + 2\varepsilon_1 \varepsilon_2 - 2\varepsilon_2 \varepsilon_5 + 2\varepsilon_4 \varepsilon_6 + 2\varepsilon_5 \varepsilon_7 \\ &- 2\varepsilon_7 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_8 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_9 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_{10} \varepsilon_{13} - \varepsilon_{17}^2 \\ &- 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{15} + 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{17} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{22} - 2\varepsilon_{19} \varepsilon_{24} \\ &+ 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{23} - 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{23} + 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{22} \\ &+ 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{17} - 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{24} + 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{23} \\ &- 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{25} + n^2 \varepsilon_{14}^2 - n^2 \varepsilon_{16}^2 \\ \zeta_3 &= \varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_1 \varepsilon_2 + 2\varepsilon_1 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_3 \varepsilon_4 - 2\varepsilon_5 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_5 \varepsilon_8 \\ &+ 2\varepsilon_6 \varepsilon_9 - \varepsilon_{15}^2 - 2\varepsilon_8 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_{10} \varepsilon_{11} + \varepsilon_{17}^2 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{18} \\ &+ 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{21} - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{19} \varepsilon_{22} + 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{23} \\ &+ 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{15} - 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{17} + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{20} + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{22} \\ &+ 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{24} - 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{23} - 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{25} \\ &+ n^2 \varepsilon_{17}^2 \\ \zeta_4 &= -\varepsilon_2^2 + \varepsilon_4^2 - 2\varepsilon_1 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_1 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_3 \varepsilon_9 \\ &- 2\varepsilon_5 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_6 \varepsilon_{10} - \varepsilon_{20}^2 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{19} - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{18} \end{aligned} \quad (49)$$

$$\begin{aligned}
 & + 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{21} + 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{18} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{20} + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{20} + 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{22} \\
 & - 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{23} + n^2 \varepsilon_{15}^2 - n^2 \varepsilon_{17}^2 \\
 \zeta_5 = & \varepsilon_5^2 + 2\varepsilon_1 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_3 \varepsilon_{13} - 2\varepsilon_5 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_6 \varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}^2 \\
 & + \varepsilon_{23}^2 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{24} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{23} + 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{25} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{22} \varepsilon_{24} - 2n^2 \varepsilon_{23} \varepsilon_{25} + n^2 \varepsilon_{23}^2 \\
 \zeta_6 = & -\varepsilon_5^2 + \varepsilon_6^2 + 2\varepsilon_1 \varepsilon_5 - 2\varepsilon_1 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_2 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_3 \varepsilon_{11} \\
 & + 2\varepsilon_4 \varepsilon_{13} - \varepsilon_{16}^2 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{22} - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{24} + 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{23} \\
 & - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{23} + 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{24} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{23} - 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{25} + n^2 \varepsilon_{22}^2 \\
 & - n^2 \varepsilon_{23}^2 \\
 \zeta_7 = & \varepsilon_7^2 - 2\varepsilon_1 \varepsilon_8 - 2\varepsilon_2 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_3 \varepsilon_{10} - \varepsilon_{18}^2 \\
 & - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{19} + 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{21} + 2\varepsilon_4 \varepsilon_9 - 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{19} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{18} - 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{21} - 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{20} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{21} \\
 & + \varepsilon_{20}^2 + n^2 \varepsilon_{20}^2 \\
 \zeta_8 = & -\varepsilon_7^2 + \varepsilon_9^2 - 2\varepsilon_2 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_4 \varepsilon_{10} + 2\varepsilon_7 \varepsilon_8 - \varepsilon_{21}^2 \\
 & - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{19} + 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{19} - 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{21} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{21} + n^2 \varepsilon_{18}^2 + n^2 \varepsilon_{20}^2 \\
 \zeta_9 = & \varepsilon_8^2 - 2\varepsilon_7 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_9 \varepsilon_{10} - \varepsilon_{19}^2 + \varepsilon_{21}^2 + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{19} \\
 & - 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{21} + n^2 \varepsilon_{21}^2 \\
 \zeta_{10} = & -\varepsilon_8^2 + \varepsilon_{10}^2 + n^2 \varepsilon_{19}^2 - n^2 \varepsilon_{21}^2 \\
 \zeta_{11} = & \varepsilon_{11}^2 - \varepsilon_{12}^2 + 2\varepsilon_5 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_6 \varepsilon_{13} - \varepsilon_{23}^2 - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{25} \\
 & - 2\varepsilon_{22} \varepsilon_{24} - 2\varepsilon_{23} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{23} \varepsilon_{25} + n^2 \varepsilon_{24}^2 - n^2 \varepsilon_{25}^2 \\
 \zeta_{12} = & \varepsilon_{12}^2 - \varepsilon_{24}^2 + \varepsilon_{25}^2 - 2\varepsilon_{23} \varepsilon_{25} + 2\varepsilon_{11} \varepsilon_{13} + n^2 \varepsilon_{25}^2 \\
 \zeta_{13} = & 2\varepsilon_1 \varepsilon_3 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_6 + 2\varepsilon_4 \varepsilon_5 + 2\varepsilon_7 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_8 \varepsilon_{13} + 2\varepsilon_9 \varepsilon_{12} \\
 & - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{17} - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{16} - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{23} - 2\varepsilon_{19} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{22} \\
 & - 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{24} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{16} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{22} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{24} \\
 \zeta_{14} = & 2\varepsilon_1 \varepsilon_4 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_3 + 2\varepsilon_5 \varepsilon_9 + 2\varepsilon_6 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_8 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_{10} \varepsilon_{12} \\
 & - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{17} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{18} - 2\varepsilon_{19} \varepsilon_{23} - 2\varepsilon_{21} \varepsilon_{22} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{17} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{16} + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{25} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{20} \varepsilon_{22} + 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{24} \\
 \zeta_{15} = & 2\varepsilon_1 \varepsilon_6 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_3 \varepsilon_5 - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{22} + 2\varepsilon_4 \varepsilon_{12} \\
 & + 2\varepsilon_7 \varepsilon_{13} - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{16} - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{23} - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{20} \varepsilon_{24} \\
 & + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{22} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{24}
 \end{aligned} \tag{49}$$

$$\begin{aligned}
 16 &= 2\varepsilon_1 \varepsilon_9 + 2\varepsilon_2 \varepsilon_4 + 2\varepsilon_3 \varepsilon_7 + 2\varepsilon_5 \varepsilon_{10} + 2\varepsilon_6 \varepsilon_8 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{21} \\
 &\quad - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{20} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{19} - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{18} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{20} \\
 &\quad + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{17} + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{18} + 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{21} \varepsilon_{22} \\
 \zeta_{17} &= 2\varepsilon_1 \varepsilon_{10} + 2\varepsilon_2 \varepsilon_9 + 2\varepsilon_3 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_4 \varepsilon_7 - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{21} \\
 &\quad - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{19} - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{20} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{20} \\
 &\quad + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{19} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{18} \\
 \zeta_{18} &= 2\varepsilon_1 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_2 \varepsilon_{13} + 2\varepsilon_3 \varepsilon_{12} + 2\varepsilon_5 \varepsilon_6 - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{23} \\
 &\quad - 2\varepsilon_{15} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{22} - 2\varepsilon_{17} \varepsilon_{24} + 2n^2 \varepsilon_{14} \varepsilon_{25} \\
 &\quad + 2n^2 \varepsilon_{16} \varepsilon_{24} + 2n^2 \varepsilon_{22} \varepsilon_{23} \\
 \zeta_{19} &= 2\varepsilon_1 \varepsilon_{13} + 2\varepsilon_5 \varepsilon_{11} + 2\varepsilon_6 \varepsilon_{12} - 2\varepsilon_{14} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{16} \varepsilon_{24} \\
 &\quad - 2\varepsilon_{22} \varepsilon_{23} + 2n^2 \varepsilon_{22} \varepsilon_{25} + 2n^2 \varepsilon_{23} \varepsilon_{24} \\
 \zeta_{20} &= -2\varepsilon_{19} \varepsilon_{20} + 2\varepsilon_2 \varepsilon_{10} + 2\varepsilon_4 \varepsilon_8 + 2\varepsilon_7 \varepsilon_9 - 2\varepsilon_{18} \varepsilon_{21} \\
 &\quad + 2n^2 \varepsilon_{15} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{17} \varepsilon_{19} + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{20} \\
 \zeta_{21} &= 2\varepsilon_5 \varepsilon_{13} + 2\varepsilon_{11} \varepsilon_{12} - 2\varepsilon_{22} \varepsilon_{25} - 2\varepsilon_{23} \varepsilon_{24} + 2n^2 \varepsilon_{24} \varepsilon_{25} \\
 \zeta_{22} &= 2\varepsilon_7 \varepsilon_{10} + 2\varepsilon_8 \varepsilon_9 - 2\varepsilon_{19} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{18} \varepsilon_{21} + 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{20} \\
 \zeta_{23} &= 2\varepsilon_8 \varepsilon_{10} + 2n^2 \varepsilon_{19} \varepsilon_{21} \\
 \zeta_{24} &= 2\varepsilon_{12} \varepsilon_{13} - 2\varepsilon_{24} \varepsilon_{25} \\
 \zeta_{25} &= \varepsilon_{13}^2 - \varepsilon_{25}^2
 \end{aligned} \tag{49}$$

Durch Quadrieren der Gleichung (48) erhält man dann unter Berücksichtigung von (49):

$$\begin{aligned}
 &[\zeta_1 \sin^{10} i + \zeta_2 \sin^{12} i + \zeta_3 \sin^{14} i + \zeta_4 \sin^{16} i + \zeta_5 \sin^6 i \\
 &\quad + \zeta_6 \sin^8 i + \zeta_7 \sin^{18} i + \zeta_8 \sin^{20} i + \zeta_9 \sin^{22} i + \zeta_{10} \sin^{24} i \\
 &\quad + \zeta_{11} \sin^4 i + \zeta_{12} \sin^2 i + \zeta_{25}] + [\zeta_{13} \sin^{11} i \cos i \\
 &\quad + \zeta_{14} \sin^{13} i \cos i + \zeta_{15} \sin^9 i \cos i + \zeta_{16} \sin^{15} i \cos i \\
 &\quad + \zeta_{17} \sin^{17} i \cos i + \zeta_{18} \sin^7 i \cos i + \zeta_{19} \sin^5 i \cos i \\
 &\quad + \zeta_{20} \sin^{19} i \cos i + \zeta_{21} \sin^3 i \cos i + \zeta_{22} \sin^{21} i \cos i \\
 &\quad + \zeta_{23} \sin^{23} i \cos i + \zeta_{24} \sin i \cos i] = 0
 \end{aligned} \tag{50}$$

Man führe folgende Grössen ein:

$$\begin{aligned}
 \eta_1 &= \zeta_{10}^2 + \zeta_{23}^2 \\
 \eta_2 &= 2\zeta_9 \zeta_{11} - \zeta_{23}^2 + 2\zeta_{22} \zeta_{23} \\
 \eta_3 &= \zeta_9^2 + 2\zeta_8 \zeta_{10} + \zeta_{22}^2 + 2\zeta_{20} \zeta_{23} - 2\zeta_{22} \zeta_{23}
 \end{aligned} \tag{51}$$

$$\begin{aligned}
 \eta_4 &= 2\zeta_7 \zeta_{10} + 2\zeta_8 \zeta_9 - \zeta_{22}^2 + 2\zeta_{17} \zeta_{23} + 2\zeta_{20} \zeta_{22} - 2\zeta_{20} \zeta_{23} \\
 \eta_5 &= \zeta_8^2 + 2\zeta_4 \zeta_{10} + 2\zeta_7 \zeta_9 + \zeta_{20}^2 + 2\zeta_{16} \zeta_{23} + 2\zeta_{17} \zeta_{22} \\
 &\quad - 2\zeta_{17} \zeta_{23} - 2\zeta_{20} \zeta_{22} \\
 \eta_6 &= 2\zeta_3 \zeta_{10} + 2\zeta_4 \zeta_9 + 2\zeta_7 \zeta_8 - \zeta_{20}^2 + 2\zeta_{14} \zeta_{23} + 2\zeta_{16} \zeta_{22} \\
 &\quad - 2\zeta_{16} \zeta_{23} + 2\zeta_{17} \zeta_{20} - 2\zeta_{17} \zeta_{22} \\
 \eta_7 &= \zeta_7^2 + 2\zeta_2 \zeta_{10} + 2\zeta_3 \zeta_9 + 2\zeta_4 \zeta_8 + \zeta_{17}^2 + 2\zeta_{13} \zeta_{23} \\
 &\quad + 2\zeta_{14} \zeta_{22} - 2\zeta_{14} \zeta_{23} + 2\zeta_{16} \zeta_{20} - 2\zeta_{16} \zeta_{22} - 2\zeta_{17} \zeta_{20} \\
 \eta_8 &= 2\zeta_1 \zeta_{10} + 2\zeta_2 \zeta_9 + 2\zeta_3 \zeta_8 + 2\zeta_4 \zeta_7 - \zeta_{17}^2 + 2\zeta_{13} \zeta_{22} \\
 &\quad - 2\zeta_{13} \zeta_{23} + 2\zeta_{14} \zeta_{20} - 2\zeta_{14} \zeta_{22} + 2\zeta_{15} \zeta_{23} + 2\zeta_{16} \zeta_{17} \\
 &\quad - 2\zeta_{16} \zeta_{20} \\
 \eta_9 &= \zeta_4^2 + 2\zeta_1 \zeta_9 + 2\zeta_2 \zeta_8 + 2\zeta_3 \zeta_7 + 2\zeta_6 \zeta_{10} + \zeta_{16}^2 \\
 &\quad + 2\zeta_{13} \zeta_{20} - 2\zeta_{13} \zeta_{22} + 2\zeta_{14} \zeta_{17} - 2\zeta_{14} \zeta_{20} + 2\zeta_{15} \zeta_{22} \\
 &\quad - 2\zeta_{15} \zeta_{23} - 2\zeta_{16} \zeta_{17} + 2\zeta_{18} \zeta_{23} \\
 \eta_{10} &= 2\zeta_1 \zeta_8 + 2\zeta_2 \zeta_7 + 2\zeta_3 \zeta_4 + 2\zeta_5 \zeta_{10} + 2\zeta_6 \zeta_9 - \zeta_{16}^2 \\
 &\quad + 2\zeta_{13} \zeta_{17} - 2\zeta_{13} \zeta_{20} + 2\zeta_{14} \zeta_{16} - 2\zeta_{14} \zeta_{17} + 2\zeta_{15} \zeta_{20} \\
 &\quad - 2\zeta_{15} \zeta_{22} + 2\zeta_{18} \zeta_{22} - 2\zeta_{18} \zeta_{23} + 2\zeta_{19} \zeta_{23} \\
 \eta_{11} &= \zeta_3^2 + 2\zeta_1 \zeta_7 + 2\zeta_2 \zeta_4 + 2\zeta_5 \zeta_9 + 2\zeta_6 \zeta_8 + 2\zeta_{10} \zeta_{11} \\
 &\quad + \zeta_{14}^2 + 2\zeta_{13} \zeta_{16} - 2\zeta_{13} \zeta_{17} - 2\zeta_{14} \zeta_{16} + 2\zeta_{15} \zeta_{17} \\
 &\quad - 2\zeta_{15} \zeta_{20} + 2\zeta_{18} \zeta_{20} - 2\zeta_{18} \zeta_{22} + 2\zeta_{19} \zeta_{22} - 2\zeta_{19} \zeta_{23} \\
 &\quad + 2\zeta_{21} \zeta_{23} \\
 \eta_{12} &= 2\zeta_1 \zeta_4 + 2\zeta_2 \zeta_3 + 2\zeta_5 \zeta_8 + 2\zeta_6 \zeta_7 + 2\zeta_9 \zeta_{11} \\
 &\quad + 2\zeta_{10} \zeta_{12} - \zeta_{14}^2 + 2\zeta_{13} \zeta_{14} - 2\zeta_{13} \zeta_{16} + 2\zeta_{15} \zeta_{16} \\
 &\quad + 2\zeta_{17} \zeta_{18} - 2\zeta_{18} \zeta_{20} + 2\zeta_{19} \zeta_{20} - 2\zeta_{19} \zeta_{22} + 2\zeta_{21} \zeta_{22} \\
 &\quad - 2\zeta_{15} \zeta_{17} - 2\zeta_{21} \zeta_{23} - 2\zeta_{23} \zeta_{24} \\
 \eta_{13} &= \zeta_2^2 + 2\zeta_1 \zeta_3 + 2\zeta_4 \zeta_6 + 2\zeta_5 \zeta_7 + 2\zeta_8 \zeta_{11} + 2\zeta_9 \zeta_{12} \\
 &\quad + 2\zeta_{10} \zeta_{25} + \zeta_{13}^2 - 2\zeta_{13} \zeta_{14} + 2\zeta_{14} \zeta_{15} - 2\zeta_{15} \zeta_{16} \\
 &\quad + 2\zeta_{16} \zeta_{18} - 2\zeta_{17} \zeta_{18} + 2\zeta_{17} \zeta_{19} - 2\zeta_{19} \zeta_{20} + 2\zeta_{20} \zeta_{21} \\
 &\quad - 2\zeta_{21} \zeta_{22} - 2\zeta_{23} \zeta_{24} + 2\zeta_{22} \zeta_{24} \\
 \eta_{14} &= 2\zeta_1 \zeta_2 + 2\zeta_3 \zeta_6 + 2\zeta_4 \zeta_5 + 2\zeta_7 \zeta_{11} + 2\zeta_8 \zeta_{12} + 2\zeta_9 \zeta_{25} \\
 &\quad - \zeta_{13}^2 + 2\zeta_{13} \zeta_{15} - 2\zeta_{14} \zeta_{15} + 2\zeta_{14} \zeta_{18} - 2\zeta_{16} \zeta_{18} \\
 &\quad + 2\zeta_{16} \zeta_{19} - 2\zeta_{17} \zeta_{19} + 2\zeta_{17} \zeta_{21} - 2\zeta_{20} \zeta_{21} + 2\zeta_{20} \zeta_{24} \\
 &\quad - 2\zeta_{22} \zeta_{24} \\
 \eta_{15} &= \zeta_1^2 + 2\zeta_2 \zeta_6 + 2\zeta_3 \zeta_5 + 2\zeta_4 \zeta_{11} + 2\zeta_7 \zeta_{12} + 2\zeta_8 \zeta_{25} \\
 &\quad + \zeta_{15}^2 - 2\zeta_{13} \zeta_{15} + 2\zeta_{13} \zeta_{18} - 2\zeta_{14} \zeta_{18} + 2\zeta_{14} \zeta_{19} \\
 &\quad - 2\zeta_{16} \zeta_{19} + 2\zeta_{16} \zeta_{21} - 2\zeta_{17} \zeta_{21} + 2\zeta_{17} \zeta_{24} - 2\zeta_{20} \zeta_{24}
 \end{aligned} \tag{51}$$

$$\left. \begin{aligned}
 \eta_{16} &= 2\zeta_1 \zeta_6 + 2\zeta_2 \zeta_5 + 2\zeta_3 \zeta_{11} + 2\zeta_4 \zeta_{12} + 2\zeta_7 \zeta_{25} - \zeta_{15}^2 \\
 &\quad - 2\zeta_{13} \zeta_{18} + 2\zeta_{13} \zeta_{19} - 2\zeta_{14} \zeta_{19} + 2\zeta_{14} \zeta_{21} + 2\zeta_{15} \zeta_{18} \\
 &\quad - 2\zeta_{16} \zeta_{21} + 2\zeta_{16} \zeta_{24} - 2\zeta_{17} \zeta_{24} \\
 \eta_{17} &= \zeta_6^2 + 2\zeta_1 \zeta_5 + 2\zeta_2 \zeta_{11} + 2\zeta_{13} \zeta_{12} + 2\zeta_4 \zeta_{25} + \zeta_{18}^2 \\
 &\quad - 2\zeta_{13} \zeta_{19} + 2\zeta_{13} \zeta_{21} - 2\zeta_{14} \zeta_{21} + 2\zeta_{14} \zeta_{24} - 2\zeta_{15} \zeta_{18} \\
 &\quad + 2\zeta_{15} \zeta_{19} - 2\zeta_{16} \zeta_{24} \\
 \eta_{18} &= 2\zeta_1 \zeta_{11} + 2\zeta_2 \zeta_{12} + 2\zeta_3 \zeta_{25} + 2\zeta_5 \zeta_6 - \zeta_{18}^2 - 2\zeta_{13} \zeta_{21} \\
 &\quad + 2\zeta_{13} \zeta_{24} - 2\zeta_{14} \zeta_{24} - 2\zeta_{15} \zeta_{19} + 2\zeta_{15} \zeta_{21} + 2\zeta_{18} \zeta_{19} \\
 \eta_{19} &= \zeta_5^2 + 2\zeta_1 \zeta_{12} + 2\zeta_2 \zeta_{25} + 2\zeta_6 \zeta_{11} + \zeta_{19}^2 - 2\zeta_{13} \zeta_{24} \\
 &\quad - 2\zeta_{15} \zeta_{21} + 2\zeta_{15} \zeta_{24} - 2\zeta_{18} \zeta_{19} + 2\zeta_{18} \zeta_{21} \\
 \eta_{20} &= 2\zeta_1 \zeta_{25} + 2\zeta_5 \zeta_{11} + 2\zeta_6 \zeta_{12} - \zeta_{19}^2 - 2\zeta_{15} \zeta_{24} \\
 &\quad - 2\zeta_{18} \zeta_{21} + 2\zeta_{18} \zeta_{24} + 2\zeta_{19} \zeta_{21} \\
 \eta_{21} &= \zeta_{11}^2 + 2\zeta_5 \zeta_{12} + 2\zeta_6 \zeta_{25} + \zeta_{21}^2 - 2\zeta_{18} \zeta_{24} - 2\zeta_{19} \zeta_{21} \\
 &\quad + 2\zeta_{19} \zeta_{24} \\
 \eta_{22} &= 2\zeta_5 \zeta_{25} + 2\zeta_{11} \zeta_{12} - \zeta_{21}^2 - 2\zeta_{19} \zeta_{24} + 2\zeta_{21} \zeta_{24} \\
 \eta_{23} &= \zeta_{12}^2 + 2\zeta_{11} \zeta_{25} + \zeta_{24}^2 - 2\zeta_{21} \zeta_{24} \\
 \eta_{24} &= 2\zeta_{12} \zeta_{25} - \zeta_{24}^2 \\
 \eta_{25} &= \zeta_{25}^2
 \end{aligned} \right\} \quad (51)$$

Durch Quadrieren der Gleichung (50) erhält man dann unter Berücksichtigung von (51), wenn man noch setzt (siehe Gl. 26).

$$A = \sin^2 i = \sin^2 i_1' \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (52)$$

$$\left. \begin{aligned}
 &\eta_1 A^{24} + \eta_2 A^{23} + \eta_3 A^{22} + \eta_4 A^{21} + \eta_5 A^{20} + \eta_6 A^{19} \\
 &\quad + \eta_7 A^{18} + \eta_8 A^{17} + \eta_9 A^{16} + \eta_{10} A^{15} + \eta_{11} A^{14} \\
 &\quad + \eta_{12} A^{13} + \eta_{13} A^{12} + \eta_{14} A^{11} + \eta_{15} A^{10} + \eta_{16} A^9 \\
 &\quad + \eta_{17} A^8 + \eta_{18} A^7 + \eta_{19} A^6 + \eta_{20} A^5 + \eta_{21} A^4 \\
 &\quad + \eta_{22} A^3 + \eta_{23} A^2 + \eta_{24} A + \eta_{25} = 0
 \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

Dividiert man die Gleichung durch η_1 , und setzt man die einzelnen Faktoren

$$\frac{\eta_x}{\eta_1} = \vartheta_{x-1}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (54)$$

so heisst die Bedingungsgleichung für die Spitze der Kaustik:

$$\left. \begin{aligned} A^{24} + \mathfrak{P}_1 A^{23} + \mathfrak{P}_2 A^{22} + \mathfrak{P}_3 A^{21} + \mathfrak{P}_4 A^{20} + \mathfrak{P}_5 A^{19} \\ + \mathfrak{P}_6 A^{18} + \mathfrak{P}_7 A^{17} + \mathfrak{P}_8 A^{16} + \mathfrak{P}_9 A^{15} + \mathfrak{P}_{10} A^{14} \\ + \mathfrak{P}_{11} A^{13} + \mathfrak{P}_{12} A^{12} + \mathfrak{P}_{13} A^{11} + \mathfrak{P}_{14} A^{10} + \mathfrak{P}_{15} A^9 \\ + \mathfrak{P}_{16} A^8 + \mathfrak{P}_{17} A^7 + \mathfrak{P}_{18} A^6 + \mathfrak{P}_{19} A^5 + \mathfrak{P}_{20} A^4 \\ + \mathfrak{P}_{21} A^3 + \mathfrak{P}_{22} A^2 + \mathfrak{P}_{23} A + \mathfrak{P}_{24} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (55)$$

Man führe noch folgende Grössen ein:

$$c_3 = \cos 2\varphi = c_2^2 - c_1^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (56)$$

$$\left. \begin{aligned} \nu_1 &= 3n^3 + 3n & \nu_{13} &= 48n^5 + 8n^7 \\ \nu_2 &= n^4 + n^2 & \nu_{14} &= 4n^3 + 3n \\ \nu_3 &= 2n^2 + 6n^4 & \nu_{15} &= 48n^6 + 8n^4 \\ \nu_4 &= 3n^5 + 3n^3 = n^2\nu_1 & \nu_{16} &= 20n^6 + 20n^4 = 20n^2\nu_2 \\ \nu_5 &= 2n^5 + 6n^3 & \nu_{17} &= n^3 + n = \frac{1}{3}\nu_1 \\ \nu_6 &= n^2 + 1 & \nu_{18} &= 6n^6 + 6n^4 = 6n^2\nu_2 \\ \nu_7 &= 9n^3 + 9n^5 = 3n^2\nu_1 & \nu_{19} &= 6n^4 + 2n^6 \\ \nu_8 &= 46n^5 + 6n^3 + 6n^7 & \nu_{20} &= 6n^5 + 2n^3 \\ \nu_9 &= 4n^2 + 4n^4 = 4\nu_2 & \nu_{21} &= 2n^5 + 2n^3 = 2n\nu_2 \\ \nu_{10} &= 6n^3 + 6n = 2\nu_1 & \nu_{22} &= 10n^3 + 10n = 10\nu_{17} \\ \nu_{11} &= 6n^7 + 6n^5 = 20n^4\nu_1 & \nu_{23} &= 3n^2 + 3 = 3\nu_6 \\ \nu_{12} &= 4n^2 + 3n^4 \end{aligned} \right\} \quad (57)$$

Dann nehmen die Ausdrücke (29), (31), (33), (36), (39), (41), (43), (45) folgende Gestalt an:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= c_2 \nu_1 & \alpha_6 &= c_1 c_2 \nu_3 \\ \alpha_2 &= 1 - n^2 c_1^2 & \alpha_7 &= - c_3 \nu_4 \\ \alpha_3 &= 2n^4 c_3 & \alpha_8 &= - c_1 c_2 \nu_5 \\ \alpha_4 &= - c_3 \nu_2 & \alpha_9 &= - c_2 \nu_6 \\ \alpha_5 &= 2n^3 c_3 & \alpha_{10} &= c_1 \nu_6 \end{aligned} \right\} \quad (58)$$

$$\begin{aligned}
 \beta_1 &= \alpha_1 \alpha_2 - 5n c_2 \alpha_4 + 3c_2 \alpha_7 - c_1^2 c_2 \nu_7 \\
 \beta_2 &= -4n^3 c_2 \alpha_2 - 8n c_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_4 - n^2 c_2 \alpha_5 \\
 &\quad - 3n^2 c_1 \alpha_8 + c_2 \alpha_4 \nu_1 + c_1^2 c_2 \nu_8 + 3n c_1 \alpha_6 \\
 \beta_3 &= -4n^3 c_1 \alpha_2 + 6n c_1 \alpha_4 - 6n^2 c_1 \alpha_5 - 2n^2 c_1 c_2 \alpha_1 \\
 &\quad - 3n c_2 \alpha_6 + 2n^5 c_1 c_2^2 \\
 \beta_4 &= -2n c_2 \alpha_2 + 3c_2 \alpha_5 \\
 \beta_5 &= 3n c_1 \alpha_2 + 3c_2 \alpha_8 + 7n^3 c_1 c_2^2 \\
 \beta_6 &= \alpha_1 \alpha_3 - 7n^3 c_2 \alpha_4 + c_2 \alpha_5 \nu_9 - 3n^2 c_2 \alpha_7 + 3n^2 c_1 \alpha_8 \\
 &\quad + c_2 \alpha_3 \nu_{10} - 3n^3 c_1 \alpha_6 - c_1^2 c_2 \nu_{11} \\
 \beta_7 &= -10n^3 c_2 \alpha_3 - 10n^4 c_2 \alpha_5 + 80n^7 c_1^2 c_2 \\
 \beta_8 &= -10n^3 c_1 \alpha_3 - 10n^4 c_1 \alpha_5 + 80n^7 c_1 c_2^2 \\
 \beta_9 &= 9n c_1 \alpha_3 - 7n^3 c_1 \alpha_4 + c_1 \alpha_5 \nu_{12} - 3n^2 c_2 \alpha_8 \\
 &\quad - 3n^2 c_1 \alpha_7 + 3n^3 c_2 \alpha_6 + c_1 c_2^2 \nu_{13} + 4n^4 c_1 c_2 \alpha_1 \\
 \beta_{10} &= 3n^3 c_1 c_2^2 \\
 \beta_{11} &= -4n^2 c_2 \alpha_2 - 5n c_2 \alpha_5 + 6c_2 \alpha_3 + 18n^4 c_1^2 c_2 \\
 \beta_{12} &= -3n^2 c_1 \alpha_2 + 3c_2 \alpha_6 - 7n^4 c_1 c_2^2 \\
 \beta_{13} &= 4n^2 c_1 \alpha_2 - 6n^2 c_1 \alpha_4 + 6n c_1 \alpha_5 - 3n c_2 \alpha_8 \\
 &\quad + 2n^3 c_1 c_2 \alpha_1 - 2n^4 c_1 c_2^2 \\
 \beta_{14} &= \frac{1}{n} \beta_7 \\
 \beta_{15} &= -9n^2 c_1 \alpha_3 + 7n^2 c_1 \alpha_4 - 4n^3 c_1 c_2 \alpha_1 - c_1 \alpha_5 \nu_{14} \\
 &\quad + 3n c_2 \alpha_8 + 3n c_1 \alpha_7 - 3n^2 c_2 \alpha_6 - c_1 c_2^2 \nu_{15} \\
 \beta_{16} &= -\frac{1}{n} \beta_8 \\
 \beta_{17} &= -7n^2 c_2 \alpha_4 + \alpha_1 \alpha_5 - 3n c_2 \alpha_7 + 3n c_1 \alpha_8 \\
 &\quad - 3n^2 c_1 \alpha_6 - c_1^2 c_2 \nu_{16} \\
 \beta_{18} &= 3c_2 \alpha_4 \\
 \beta_{19} &= -3n^2 c_1 c_2^2
 \end{aligned} \tag{59}$$

$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= c_2 \alpha_2 & \gamma_6 &= -n^2 c_2 \alpha_3 - n^3 c_2 \alpha_5 \\
 \gamma_2 &= c_2 \alpha_3 - n^2 c_2 \alpha_2 & &+ 8n^6 c_1^2 c_2 \\
 &\quad - n c_2 \alpha_5 + 4n^4 c_1^2 c_2 & \gamma_7 &= -n^2 c_2 \alpha_4 + c_2 \alpha_5 \nu_{17} \\
 \gamma_3 &= c_2 \alpha_4 & &- c_1^2 c_2 \nu_{18} \\
 \gamma_4 &= -2n^2 c_1 c_2^2 & \gamma_8 &= -n^2 c_1 \alpha_4 + n c_1 \alpha_5 \\
 \gamma_5 &= -n^2 c_1 \alpha_2 + 2n^4 c_1 c_2^2 & &+ c_1 c_2^2 \nu_{19}
 \end{aligned} \tag{60}$$

$$\left. \begin{aligned} \gamma_9 &= -n^2 c_1 \alpha_3 - n^3 c_1 \alpha_5 & \gamma_{14} &= -n^2 c_2 \alpha_5 - nc_2 \alpha_3 \\ &\quad - 8n^6 c_1 c_2^2 & &\quad + 8n^5 c_1^2 c_2 \\ \gamma_{10} &= nc_1 \alpha_2 - 2n^3 c_1 c_2^2 & \gamma_{15} &= -n^2 c_1 \alpha_5 + nc_1 \alpha_4 \\ \gamma_{11} &= c_2 \alpha_5 - nc_2 \alpha_2 & &\quad - c_1 c_2^2 \nu_{20} \\ \gamma_{12} &= 2n^3 c_1 c_2^2 & \gamma_{16} &= -nc_2 \alpha_4 - c_1^2 c_2 \nu_{21} \\ \gamma_{13} &= n^2 c_1 \alpha_5 + nc_1 \alpha_3 + 8n^5 c_1 c_2^2 \end{aligned} \right\} (60)$$

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= 3n \alpha_9 - 7n c_2 & \delta_7 &= -\frac{1}{n} \delta_2 \\ \delta_2 &= 14n^3 c_2 & & \\ \delta_3 &= c_1 \nu_{22} & \delta_8 &= \frac{1}{n} \delta_4 \\ \delta_4 &= -14n^3 c_1 & & \\ \delta_5 &= -6n c_1 & \delta_9 &= c_1 \nu_{23} \\ \delta_6 &= -3\alpha_9 + 7n^2 c_2 \end{aligned} \right\} (61)$$

Wir sind also zu folgendem Resultat gekommen:

Um zu untersuchen, unter welcher Bedingung ein Lichtstrahl nach der Brechung durch eine halbkugelförmige Konvexplanlinse durch die Spitze der Kaustik geht, berechne man zunächst nach (57) die Grössen ν aus dem Brechungsexponenten n der Linsensubstanz. Aus dem Winkel φ , den die einfallenden Lichtstrahlen mit der optischen Achse bilden, berechne man die Grössen c gemäss (27) und (56). Aus diesen Grössen ν und c ergeben sich die Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta, \vartheta$ aus (58), (59), (60), (61), (47), (49), (51), (54). Dann liefert die Gleichung (55) die Bedingung für die Spitze der Kaustik, wenn $\triangle = \sin^2 i_1'$ ist, wo i_1' der Brechungswinkel an der ersten Linsenfläche ist.

§ 3. Die Spitze der Kaustik für die zwei Fälle

$$\varphi = 0^0, \varphi = 5^0.$$

I. $\varphi = 0^0$. Die Bedingungsgleichung für die Spitze der

Kaustik — Gleichung (55) — soll zunächst angewendet werden auf den Fall $\varphi = 0^\circ$ d. h. auf den Fall achsenparalleler Strahlen. In dem Fall muss sich, sofern Gleichung (55) richtig sein soll, $i_1' = 0$ ergeben, denn aus Symmetriegründen liegt die Spitze der Kaustik auf der optischen Achse.

Ist der Brechungsexponent der Linse $n = 1,6$, so ergeben sich aus (57) folgende Werte:

$\nu_1 =$	17,0880	$\nu_{13} =$	718,0600
$\nu_2 =$	9,1136	$\nu_{14} =$	21,1840
$\nu_3 =$	44,4416	$\nu_{15} =$	857,7290
$\nu_4 =$	43,7450	$\nu_{16} =$	466,6000
$\nu_5 =$	45,5470	$\nu_{17} =$	2,5756
$\nu_6 =$	3,5600	$\nu_{18} =$	139,9850
$\nu_7 =$	131,2400	$\nu_{19} =$	72,8770
$\nu_8 =$	667,9760	$\nu_{20} =$	71,1060
$\nu_9 =$	36,4550	$\nu_{21} =$	29,1630
$\nu_{10} =$	34,1750	$\nu_{22} =$	25,7560
$\nu_{11} =$	2239,7500	$\nu_{23} =$	10,6800
$\nu_{12} =$	29,9008		

Aus (27) und (56) folgt:

$$c_1 = 0$$

$$c_2 = 1$$

$$c_3 = 1$$

Aus diesen Werten ν und c ergeben sich die Grössen α gemäss (58):

$\alpha_1 =$	24,4610	$\alpha_6 =$	0
$\alpha_2 =$	1	$\alpha_7 =$	— 51,1180
$\alpha_3 =$	13,1070	$\alpha_8 =$	0
$\alpha_4 =$	— 9,1136	$\alpha_9 =$	— 3,5600
$\alpha_5 =$	8,1920	$\alpha_{10} =$	0

Aus (59) ergeben sich die Werte für β :

$\beta_1 =$	250,723	$\beta_{11} =$	2,866
$\beta_2 = -$	583,739	$\beta_{12} =$	0
$\beta_3 =$	0	$\beta_{13} =$	0
$\beta_4 =$	21,276	$\beta_{14} = -$	671,100
$\beta_5 =$	0	$\beta_{15} =$	0
$\beta_6 =$	1720,816	$\beta_{16} =$	0
$\beta_7 = -$	1073,760	$\beta_{17} =$	609,071
$\beta_8 =$	0	$\beta_{18} = -$	27,341
$\beta_9 =$	0	$\beta_{19} =$	0
$\beta_{10} =$	0		

Aus (60) ergeben sich die Werte:

$\gamma_1 =$	1	$\gamma_9 =$	0
$\gamma_2 = -$	2,5600	$\gamma_{10} =$	0
$\gamma_3 = -$	9,1136	$\gamma_{11} =$	6,592
$\gamma_4 =$	0	$\gamma_{12} =$	0
$\gamma_5 =$	0	$\gamma_{13} =$	0
$\gamma_6 = -$	54,5250	$\gamma_{14} = -$	41,941
$\gamma_7 =$	23,3310	$\gamma_{15} =$	0
$\gamma_8 =$	0	$\gamma_{16} =$	14,581

Aus (61) ergeben sich die Werte:

$\delta_1 = -$	28,288	$\delta_6 =$	28,600
$\delta_2 =$	57,344	$\delta_7 = -$	35,840
$\delta_3 =$	0	$\delta_8 =$	0
$\delta_4 =$	0	$\delta_9 =$	0
$\delta_5 =$	0		

Aus (47) ergeben sich die Werte:

$\varepsilon_1 =$	1117,3	$\varepsilon_{14} =$	— 945,3
$\varepsilon_2 =$	— 3851,3	$\varepsilon_{15} =$	3355,2
$\varepsilon_3 =$	0	$\varepsilon_{16} =$	0
$\varepsilon_4 =$	0	$\varepsilon_{17} =$	0
$\varepsilon_5 =$	190,18	$\varepsilon_{18} =$	— 4859,3
$\varepsilon_6 =$	0	$\varepsilon_{19} =$	2061,6
$\varepsilon_7 =$	6769,8	$\varepsilon_{20} =$	0
$\varepsilon_8 =$	3298,2	$\varepsilon_{21} =$	0
$\varepsilon_9 =$	0	$\varepsilon_{22} =$	208,58
$\varepsilon_{10} =$	0	$\varepsilon_{23} =$	0
$\varepsilon_{11} =$	0	$\varepsilon_{24} =$	5,601
$\varepsilon_{12} =$	— 15,458	$\varepsilon_{25} =$	0
$\varepsilon_{13} =$	0		

Gemäss (49) ergibt sich:

$\zeta_1 =$	— 342 325,2	$\zeta_{14} =$	0
$\zeta_2 =$	495 729,5	$\zeta_{15} =$	0
$\zeta_3 =$	— 379 038,0	$\zeta_{16} =$	0
$\zeta_4 =$	314 980,0	$\zeta_{17} =$	0
$\zeta_5 =$	— 31 188,0	$\zeta_{18} =$	0
$\zeta_6 =$	133 482,4	$\zeta_{19} =$	0
$\zeta_7 =$	— 155 550,0	$\zeta_{20} =$	0
$\zeta_8 =$	9 500,0	$\zeta_{21} =$	0
$\zeta_9 =$	— 8 620,0	$\zeta_{22} =$	0
$\zeta_{10} =$	2 550,0	$\zeta_{23} =$	0
$\zeta_{11} =$	3 384,4	$\zeta_{24} =$	0
$\zeta_{12} =$	207,6	$\zeta_{25} =$	0
$\zeta_{13} =$	0		

Aus Gleichung (50) ergibt sich dann die Bedingungs-
gleichung für die Spitze der Kaustik, wenn man nach
Potenzen von Δ ordnet und die Gleichung durch ζ_{10} divi-
diert;

$$\begin{aligned} &A^{12} - 3,38 A^{11} + 3,73 A^{10} - 59,43 A^9 + 123,52 A^8 \\ &- 148,64 A^7 + 194,40 A^6 - 134,25 A^5 + 52,11 A^4 \\ &- 12,23 A^3 + 1,33 A^2 + 0,08 A = 0 \end{aligned}$$

Eine Wurzel dieser Gleichung ist also $\triangle=0$, d. h. gemäss Gleichung (26) $i_1'=0$; es ergibt sich also, wie zu erwarten war, dass für $\varphi=0^0$ die Spitze der Kaustik auf der optischen Achse gelegen ist.

II. $\varphi=5^0$. Für diesen wie für jeden andern Fall bleiben die Grössen ν , die nur vom Brechungsexponenten der Linsensubstanz abhängig sind, dieselben wie bei dem Fall $\varphi=0^0$.

Aus (27) und (56) folgt:

$$\begin{aligned} c_1 &= 0,187\ 156 \\ c_2 &= 0,996\ 180 \\ c_c &= 0,984\ 800 \end{aligned}$$

Aus (58) folgt:

$$\begin{array}{ll} \alpha_1 = & 17,0230 & \alpha_6 = & 3,8586 \\ \alpha_2 = & 0,9806 & \alpha_7 = - & 43,0800 \\ \alpha_3 = & 12,9080 & \alpha_8 = - & 3,9545 \\ \alpha_4 = - & 8,9752 & \alpha_9 = - & 3,5464 \\ \alpha_5 = & 8,0675 & \alpha_{10} = & 0,3103 \end{array}$$

Aus (59) folgt:

$$\begin{array}{ll} \beta_1 = - & 104,899 & \beta_{11} = & 3,748 \\ \beta_2 = - & 497,412 & \beta_{12} = & 6,908 \\ \beta_3 = - & 43,914 & \beta_{13} = & 49,525 \\ \beta_4 = & 20,984 & \beta_{14} = - & 648,190 \\ \beta_5 = & 8,928 & \beta_{15} = - & 219,690 \\ \beta_6 = & 1514,371 & \beta_{16} = & 173,690 \\ \beta_7 = - & 1037,149 & \beta_{17} = & 495,782 \\ \beta_8 = - & 277,902 & \beta_{18} = - & 26,823 \\ \beta_9 = & 266,829 & \beta_{19} = - & 0,664 \\ \beta_{10} = & 1,063 & & \end{array}$$

Aus (60) folgen die Werte:

$\gamma_1 =$	0,9768	$\gamma_9 =$	— 17,3690
$\gamma_2 =$	— 2,3023	$\gamma_{10} =$	— 0,5718
$\gamma_3 =$	— 8,9408	$\gamma_{11} =$	6,4740
$\gamma_4 =$	— 0,4428	$\gamma_{12} =$	0,7086
$\gamma_5 =$	0,9149	$\gamma_{13} =$	10,8560
$\gamma_6 =$	— 64,8200	$\gamma_{14} =$	— 40,5130
$\gamma_7 =$	42,5290	$\gamma_{15} =$	— 9,2018
$\gamma_8 =$	9,4308	$\gamma_{16} =$	— 14,5260

Aus (61) folgt:

$\delta_1 =$	— 28,180	$\delta_6 =$	7,213
$\delta_2 =$	57,126	$\delta_7 =$	— 35,703
$\delta_3 =$	2,245	$\delta_8 =$	— 3,124
$\delta_4 =$	— 4,998	$\delta_9 =$	0,931
$\delta_5 =$	— 0,837		

Aus (47) folgt:

$\varepsilon_1 =$	890,115	$\varepsilon_{14} =$	— 1 548,053
$\varepsilon_2 =$	— 6 787,765	$\varepsilon_{15} =$	6 489,115
$\varepsilon_3 =$	— 1 067,748	$\varepsilon_{16} =$	— 95,087
$\varepsilon_4 =$	3 284,500	$\varepsilon_{17} =$	1 003,505
$\varepsilon_5 =$	— 45,941	$\varepsilon_{18} =$	— 7 569,698
$\varepsilon_6 =$	86,748	$\varepsilon_{19} =$	1 937,058
$\varepsilon_7 =$	11 167,420	$\varepsilon_{20} =$	— 1 753,675
$\varepsilon_8 =$	— 3 099,160	$\varepsilon_{21} =$	705,050
$\varepsilon_9 =$	— 3 590,270	$\varepsilon_{22} =$	— 90,188
$\varepsilon_{10} =$	1 128,050	$\varepsilon_{23} =$	4,7699
$\varepsilon_{11} =$	1,974	$\varepsilon_{24} =$	26,903
$\varepsilon_{12} =$	— 15,742	$\varepsilon_{25} =$	0,7849
$\varepsilon_{13} =$	— 0,241		

Aus (49) ergibt sich:

$\zeta_1 =$	1 813 054,40	$\zeta_{14} =$	— 7 608 324,50
$\zeta_2 =$	6 254 444,44	$\zeta_{15} =$	218 275,74
$\zeta_3 =$	— 32 273 839,85	$\zeta_{16} =$	15 483 511,00
$\zeta_4 =$	45 486 723,16	$\zeta_{17} =$	— 12 556 065,00
$\zeta_5 =$	35 099,31	$\zeta_{18} =$	— 55 648,71
$\zeta_6 =$	— 674 408,22	$\zeta_{19} =$	5 395,09
$\zeta_7 =$	— 23 589 040,00	$\zeta_{20} =$	2 956 400,00
$\zeta_8 =$	3 892 570,00	$\zeta_{21} =$	— 46,91
$\zeta_9 =$	— 7 310,00	$\zeta_{22} =$	— 1 040,00
$\zeta_{10} =$	1 220,00	$\zeta_{23} =$	270,00
$\zeta_{11} =$	8 017,64	$\zeta_{24} =$	— 34,63
$\zeta_{12} =$	— 482,20	$\zeta_{25} =$	— 0,56
$\zeta_{13} =$	1 011 194,63		

Aus (51) folgt:

$\eta_1 =$	1 561 298,3
$\eta_2 =$	— 118 176 478,3
$\eta_3 =$	11 151 356 450,0
$\eta_4 =$	— 132 548 434 570,0
$\eta_5 =$	24 103 898 760 000,0
$\eta_6 =$	— 267 472 417 400 000,0
$\eta_7 =$	1 234 573 104 085 000,0
$\eta_8 =$	— 3 080 388 115 735 000,0
$\eta_9 =$	4 510 994 639 469 200,0
$\eta_{10} =$	10 195 953 126 050,0
$\eta_{11} =$	1 863 698 423 384 316,7
$\eta_{12} =$	— 297 260 422 045 559,7
$\eta_{13} =$	— 135 024 842 964 123,96
$\eta_{14} =$	74 635 242 651 963,2
$\eta_{15} =$	— 9 264 347 675 320,0
$\eta_{16} =$	— 2 451 425 552 500,0
$\eta_{17} =$	733 158 291 600,0

$\eta_{18} = -$	30 820 305 200,0
$\eta_{19} = -$	10 632 088 040,0
$\eta_{20} =$	1 195 744 740,0
$\eta_{21} =$	27 464 107,0
$\eta_{22} = -$	7 399 242,7
$\eta_{23} =$	221 516,9
$\eta_{24} = -$	661,3
$\eta_{25} =$	0,3†

Aus diesen Grössen η ergibt sich nach (54):

$\mathfrak{J}_1 = -$	75,69	$\mathfrak{J}_{13} =$	47 803 000,0
$\mathfrak{J}_2 =$	7 142,1	$\mathfrak{J}_{14} = -$	5 933 800,0
$\mathfrak{J}_3 = -$	84 903,6	$\mathfrak{J}_{15} = -$	1 570 100,0
$\mathfrak{J}_4 =$	15 438 500,0	$\mathfrak{J}_{16} =$	469 580,0
$\mathfrak{J}_5 = -$	171 310 000,0	$\mathfrak{J}_{17} = -$	19 739,8
$\mathfrak{J}_6 =$	790 890 000,0	$\mathfrak{J}_{18} = -$	6 809,7
$\mathfrak{J}_7 = -$	1 972 960 000,0	$\mathfrak{J}_{19} =$	765,84
$\mathfrak{J}_8 =$	2 889 240 000,0	$\mathfrak{J}_{20} =$	17,59
$\mathfrak{J}_9 =$	6 530 500,0	$\mathfrak{J}_{21} = -$	4,74
$\mathfrak{J}_{10} =$	1 193 700 000,0	$\mathfrak{J}_{22} =$	0,142
$\mathfrak{J}_{11} = -$	190 390 000,0	$\mathfrak{J}_{23} = -$	0,000 424
$\mathfrak{J}_{12} = -$	86 478 400,0	$\mathfrak{J}_{24} =$	0,000 000 199 3

Die Bedingungsgleichung für die Spitze der Kaustik wird also nach Gleichung (55):

$$\begin{aligned}
 A^{24} &= 75,69 A^{23} + 7142,1 A^{22} - 84 903,6 A^{21} \\
 &+ 15 438 500,0 A^{20} - 171 310 000,0 A^{19} + 790 890 000,0 A^{18} \\
 &- 1 972 960 000,0 A^{17} + 2 889 240 000,0 A^{16} \\
 &+ 6 530 500,0 A^{15} + 1 193 700 000,0 A^{14} \\
 &- 190 390 000,0 A^{13} - 86 478 400,0 A^{12} \\
 &+ 47 803 000,0 A^{11} - 5 933 800,0 A^{10} - 1 570 100,0 A^9 \\
 &+ 469 580,0 A^8 - 19 739,8 A^7 - 6 809,7 A^6 + 765,84 A^5 \\
 &+ 17,59 A^4 - 4,739 A^3 + 0,141 754 A^2 - 0,000 423 56 A \\
 &+ 0,000 000 199 263 = 0
 \end{aligned}$$

Durch Annäherung erhält man aus dieser Gleichung:

$$A = 0,001\,387\,14$$

Es soll nun der Ort des [M. B.], der dem so berechneten Werte von A entspricht, bestimmt werden.

Aus Fig. 7 folgt, wenn man $AO=1$ setzt:

$$\frac{l}{r} = \frac{\sin i_1}{\sin \varphi}$$

Da $r=1$ angenommen war, und da $\sin \varphi = c_1$ gesetzt war, so ergibt sich zufolge Gleichung (26):

$$l = \frac{\sin i_1}{c_1} = \frac{n \cdot \sin i_1'}{c_1} = \frac{n \sqrt{A}}{c_1}$$

Für die Entfernung des Mittelpunktes der natürlichen Blende von der ersten brechenden Fläche ergibt sich also:

$$x_1 = 1 - \frac{n \sqrt{A}}{c_1} \dots \dots \dots (62)$$

Diese Gleichung liefert für den eben berechneten Wert von A :

$$x_1 = 0,316$$

oder abgekürzt:

$$x_1 = 0,32,$$

während sich für achsenparallele Strahlen⁸ ergeben wird $x_1=0,31$. Beim Uebergang von $\varphi=0^0$ zu $\varphi=5^0$ hat sich der [M. B.] also nur um den geringen Betrag von $\frac{r}{100}$ nach rechts verschoben.

§ 4. Die angenäherte Bedingungsgleichung für die Spitze der Kaustik.

Um die Lage des [M. B.] auch für andere Werte von

8. Siehe Kap. II § 8.

φ zu bestimmen, müsste man für jeden dieser Winkel dieselben Rechnungen durchführen wie für den Fall $\varphi = 5^0$, ein äusserst kompliziertes und umständliches Verfahren. Einfacher führt folgende Ueberlegung zum Ziel:

Setzt man in Gleichung (61a) $\mathcal{A} = 0$, so erhält man:

$$0,000\ 000\ 199\ 263 \text{ ungleich } 0,$$

d. h. Gleichung (61a) wird mit genügender Annäherung durch den Wert $\mathcal{A} = 0$ befriedigt. Der Winkel i_1' selbst, der dem Fundamentalstrahl entspricht, ist also, wenn nicht streng Null, so doch äusserst klein, sodass man also seine höheren Potenzen vernachlässigen kann.

Es soll nun für den Fall $\varphi = 45^0$, also für eine verhältnismässig grosse Neigung, untersucht werden, von welcher Grössenordnung der zum Fundamentalstrahl gehörige Wert $\mathcal{A}$ ist. Zu diesem Zweck ist nur das freie Glied der Gleichung (55) für den Fall $\varphi = 45^0$ zu ermitteln:

Für diesen Winkel ist:

$$c_1 = 0,70712$$

$$c_2 = 0,70712$$

$$c_3 = 0$$

Ausser den Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ brauchen von den übrigen Grössen nur berechnet zu werden: $\varepsilon_8, \varepsilon_{10}, \varepsilon_{13}, \varepsilon_{19}, \varepsilon_{21}, \varepsilon_{25}; \zeta_{10}, \zeta_{23}, \zeta_{25}; \eta_1, \eta_{25}; \vartheta_{24}$.

Es ergibt sich analog der vorigen Berechnung:

$\alpha_1 =$	12,083	$\alpha_6 =$	22,222
$\alpha_2 = -$	0,28003	$\alpha_7 =$	0
$\alpha_3 =$	0	$\alpha_8 = -$	22,724
$\alpha_4 =$	0	$\alpha_9 = -$	2,5173
$\alpha_5 =$	0	$\alpha_{10} =$	2,5173
$\beta_1 = -$	49,786	$\beta_{11} =$	43,736
$\beta_2 =$	438,519	$\beta_{12} =$	32,440
$\beta_3 = -$	95,697	$\beta_{13} =$	120,129

$\beta_4 =$	0,6336	$\beta_{14} =$	474,54
$\beta_5 = -$	39,124	$\beta_{15} = -$	600,224
$\beta_6 = -$	1108,667	$\beta_{16} =$	474,64
$\beta_7 =$	759,28	$\beta_{17} = -$	362,96
$\beta_8 = -$	759,28	$\beta_{18} =$	0
$\beta_9 =$	729,007	$\beta_{19} = -$	2,7154
$\beta_{10} =$	4,3446		
$\gamma_1 = -$	0,1980	$\gamma_9 = -$	47,455
$\gamma_2 =$	9,7754	$\gamma_{10} = -$	3,2132
$\gamma_3 =$	0	$\gamma_{11} = -$	3,1682
$\gamma_4 = -$	1,809	$\gamma_{12} =$	2,8964
$\gamma_5 =$	5,1518	$\gamma_{13} =$	29,659
$\gamma_6 =$	47,455	$\gamma_{14} =$	29,659
$\gamma_7 = -$	49,493	$\gamma_{15} = -$	25,1403
$\gamma_8 =$	25,767	$\gamma_{16} = -$	10,311
$\delta_1 = -$	20,0027	$\delta_6 =$	20,2235
$\delta_2 =$	40,549	$\delta_7 = -$	25,343
$\delta_3 =$	18,213	$\delta_8 = -$	25,343
$\delta_4 = -$	40,549	$\delta_9 =$	7,552
$\delta_5 = -$	6,7883		
$\epsilon_8 =$	3298,82	$\epsilon_{19} = -$	2061,68
$\epsilon_{10} =$	0	$\epsilon_{21} =$	0
$\epsilon_{13} = -$	4,4163	$\epsilon_{25} =$	6,4109
$\xi_{10} = -$	350,0	$\eta_1 =$	122500,0
$\xi_{23} =$	0	$\eta_{25} =$	466,42
$\xi_{25} = -$	21,597		

Das freie Glied der Bedingungsgleichung (55) wird also in diesem Fall

$$\vartheta_{24} = \frac{\eta_{25}}{\eta_1} = 0,0038075$$

Man kommt also zu folgendem Resultat:

Nicht nur für achsenparallele Strahlen

sondern auch für Strahlen, die im Objekt-
raum unter starker Neigung zur optischen
Achse verlaufen, ist der zum Fundamental-
strahl gehörige Wert von $\mathcal{A} = \sin^2 i_1'$, wo i_1'
der Brechungswinkel an der ersten Linsen-
fläche ist, von sehr geringer Grösse.

In Gleichung (55) können also die Potenzen der Grösse $\mathcal{A}$
von der zweiten an vernachlässigt werden, sodass die an-
genäherte Bedingung für die Spitze der Kaustik zufolge (53)
und (55) ist:

$$\mathcal{A} = -\frac{\mathcal{J}_{24}}{\mathcal{J}_{23}} = -\frac{\eta_{25}}{\eta_{24}}$$

Beachtet man Gleichung (62), so erhält man allgemein
als Entfernung des [M. B.] von der ersten brechenden
Fläche:

$$x_1 = 1 - \frac{n\sqrt{\Omega}}{c_1} \quad (63)$$

$$\text{wenn } \Omega = -\frac{\eta_{25}}{\eta_{24}} \text{ gesetzt ist.} \quad (64)$$

Es sollen nun noch folgende Grössen eingeführt werden:

$x_1 = -6n^5 - 14n^3$	$x_{10} = 17n^4 + 6n^2$
$x_2 = -12n^3 - 9n$	$x_{11} = -15n^4$
$x_3 = 12n^5 + 9n^3$	$x_{12} = 15n^2$
$x_4 = -3n^5 - 16n^3$	$x_{13} = 15n^4 + 6n^2$
$x_5 = -3n^5 - 3n^3$	$x_{14} = -12n^2 - 3$
$x_6 = 3n^3 + 10n$	$x_{15} = 6n^4$
$x_7 = 3n^3$	$x_{16} = 3n^4$
$x_8 = 6n$	$x_{17} = -3n^2 - 3$
$x_9 = -6n^3$	$x_{18} = 3n^4 + 3n^2$

$$\lambda_1 = c_1 c_2^3$$

$$\lambda_4 = c_1^2 c_2^2$$

$$\lambda_2 = c_1 c_2$$

$$\lambda_5 = c_2^4$$

$$\lambda_3 = c_1^3 c_2$$

$$\lambda_6 = c_2^2$$

Dann erhält man aus (47) unter Berücksichtigung von (57), (58), (59), (60), (61) nach einigen Umformungen:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{11} &= \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 \\ \varepsilon_{12} &= \lambda_4 x_4 + \lambda_5 x_5 + \lambda_6 x_6 \\ \varepsilon_{13} &= \lambda_1 x_7 + \lambda_2 x_8 + \lambda_3 x_9 \\ \varepsilon_{23} &= \lambda_1 x_{10} + \lambda_3 x_{11} + \lambda_2 x_{12} \\ \varepsilon_{24} &= \lambda_4 x_{13} + \lambda_6 x_{14} + \lambda_5 x_{15} \\ \varepsilon_{25} &= \lambda_1 x_{16} + \lambda_2 x_{17} + \lambda_3 x_{18}\end{aligned}$$

Ferner ergeben sich aus (49) und (51):

$$\begin{aligned}\zeta_{12} &= \varepsilon_{12}^2 - \varepsilon_{24}^2 + \varepsilon_{25}^2 - 2\varepsilon_{23}\varepsilon_{25} + 2\varepsilon_{11}\varepsilon_{13} + n_2\varepsilon_{25}^2 \\ \zeta_{24} &= 2\varepsilon_{12}\varepsilon_{13} - 2\varepsilon_{24}\varepsilon_{25} \\ \zeta_{25} &= \varepsilon_{13}^2 - \varepsilon_{25}^2 \\ \eta_{24} &= 2\zeta_{12}\zeta_{25} - \zeta_{24}^2 \\ \eta_{25} &= \zeta_{25}^2\end{aligned}$$

Es hat sich also folgendes Resultat ergeben:

Fällt ein Bündel paralleler Strahlen, die mit der optischen Achse den Winkel φ bilden, auf eine halbkugelförmige Konvexplanlinse vom Radius $r=1$ und dem Brechungsexponenten n , so berechne man aus der Grösse n die Werte:

$$\begin{array}{ll}x_1 = -6n^5 - 14n^3 & x_{10} = 17n^4 + 6n^2 \\ x_2 = -12n^3 - 9n & x_{11} = -15n^4 \\ x_3 = 12n^5 + 9n^3 & x_{12} = 15n^2 \\ x_4 = -3n^5 - 16n^3 & x_{13} = 15n^4 + 6n^2 \\ x_5 = -3n^5 - 3n^3 & x_{14} = -12n^2 - 3 \\ x_6 = 3n^3 - 10n & x_{15} = 6n^4 \\ x_7 = -3n^3 & x_{16} = 3n^4 \\ x_8 = 6n & x_{17} = -3n^2 - 3 \\ x_9 = -6n^3 & x_{18} = 3n^4 + 3n^2\end{array}$$

Mit Hilfe des Winkels φ berechne man:

$$c_1 = \sin \varphi$$

$$c_2 = \cos \varphi$$

$$\lambda_1 = c_1 c_2^3$$

$$\lambda_4 = c_1^2 c_2^2$$

$$\lambda_2 = c_1 c_2$$

$$\lambda_5 = c_2^4$$

$$\lambda_3 = c_1^3 c_2$$

$$\lambda_6 = c_2^2$$

Aus den so gewonnenen Grössen x und λ berechne man die Grössen:

$$\varepsilon_{11} = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3$$

$$\varepsilon_{23} = \lambda_1 x_{10} + \lambda_3 x_{11} + \lambda_2 x_{12}$$

$$\varepsilon_{12} = \lambda_4 x_4 + \lambda_5 x_5 + \lambda_6 x_6$$

$$\varepsilon_{24} = \lambda_4 x_{13} + \lambda_6 x_{14} + \lambda_5 x_{15}$$

$$\varepsilon_{13} = \lambda_1 x_7 + \lambda_2 x_8 + \lambda_3 x_9$$

$$\varepsilon_{25} = \lambda_1 x_{16} + \lambda_2 x_{17} + \lambda_3 x_{18}$$

$$\zeta_{12} = \varepsilon_{12}^2 - \varepsilon_{24}^2 + \varepsilon_{25}^2 - 2\varepsilon_{23}\varepsilon_{25} + 2\varepsilon_{11}\varepsilon_{13} + n^2\varepsilon_{25}^2$$

$$\zeta_{24} = 2\varepsilon_{12}\varepsilon_{13} - 2\varepsilon_{24}\varepsilon_{25}$$

$$\zeta_{25} = \varepsilon_{13}^2 - \varepsilon_{25}^2$$

$$\eta_{24} = 2\zeta_{12}\zeta_{25} - \zeta_{24}^2$$

$$\eta_{25} = \zeta_{25}^2$$

$$\Omega = -\frac{\eta_{25}}{\eta_{24}}$$

Die Entfernung x_1 des [M. B.] von der ersten Linsenfläche berechnet sich dann aus der Gleichung

$$x_1 = 1 - \frac{n\sqrt{\Omega}}{c_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (65)$$

§ 5. Ort der natürlichen Blende für verschiedene Strahlenneigungen.

Es soll nun nach diesem Verfahren für einige Strahlenneigungen der [M. B.] seiner Lage nach bestimmt werden.

Für $n = 1,6$ ergeben sich die Grössen⁹:

9. Das Minuszeichen hinter dem Logarithmus deutet auf einen negativen Numerus.

$\log x_1 = 2,08012.2 -$	$\log x_{10} = 2,10301.8$
$\log x_2 = 1,80313.2 -$	$\log x_{11} = 1,99257 -$
$\log x_3 = 2,21136.3$	$\log x_{12} = 1,58433$
$\log x_4 = 1,98674.2 -$	$\log x_{13} = 2,05560.8$
$\log x_5 = 1,64093 -$	$\log x_{14} = 1,52789 -$
$\log x_6 = 1,45160$	$\log x_{15} = 1,59463$
$\log x_7 = 1,08948 -$	$\log x_{16} = 1,29360$
$\log x_8 = 0,98227$	$\log x_{17} = 1,02857 -$
$\log x_9 = 1,39051.2 -$	$\log x_{18} = 1,43681.6$

Ist φ sehr klein, sodass man setzen kann $\varphi = 0^0$, so wird der Ausdruck $\frac{n\sqrt{\Omega}}{c_1}$ unbestimmt, Gleichung (65) kann also für diesen Fall nicht zur Bestimmung von x_1 benutzt werden. Es sei vorgreifend⁸ bemerkt, dass für $\varphi = 0^0$ sich ergibt $x_1 = 0,31$.

I. $\varphi = 5^0$

$\log c_1 = 0,94030 - 2$	$\log c_2 = 0,99834 - 1$
$\log \lambda_1 = 0,93532 - 2$	$\log \lambda_4 = 0,87728 - 3$
$\log \lambda_2 = 0,93964 - 2$	$\log \lambda_5 = 0,99336 - 1$
$\log \lambda_3 = 0,81924 - 4$	$\log \lambda_6 = 0,99668 - 1$
$\log \varepsilon_{11} = 1,19791.4 -$	$\log \varepsilon_{23} = 1,15204.2$
$\log \varepsilon_{12} = 1,19700 -$	$\log \varepsilon_{24} = 0,78666.6$
$\log \varepsilon_{13} = 0,38286.6 - 1 -$	$\log \varepsilon_{25} = 0,89476 - 1$
$\log \zeta_{12} = 2,29623$	$\log \eta_{24} = 2,35141 -$
$\log \zeta_{24} = 0,30161.4 -$	$\log \eta_{25} = 0,49264 - 1$
$\log \zeta_{25} = 0,74632 - 1 -$	
$\log \Omega = 0,14123 - 3$	

$$x_1 = 0,32$$

II. $\varphi = 15^0$

$\log c_1 = 0,41300 - 1$	$\log c_2 = 0,98494 - 1$
--------------------------	--------------------------

$$\begin{array}{ll} \log \lambda_1 = 0,36782 - 1 & \log \lambda_4 = 0,79588 - 2 \\ \log \lambda_2 = 0,39794 - 1 & \log \lambda_5 = 0,93976 - 1 \\ \log \lambda_3 = 0,22394 - 2 & \log \lambda_6 = 0,96988 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \varepsilon_{11} = 1,61504.4 - & \log \varepsilon_{23} = 1,57429.6 \\ \log \varepsilon_{12} = 1,24917.5 - & \log \varepsilon_{24} = 0,99441 \\ \log \varepsilon_{13} = 0,94335.5 - 1 - & \log \varepsilon_{25} = 0,37544.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \zeta_{12} = 2,12004.8 & \log \eta_{24} = 3,18455 - \\ \log \zeta_{24} = 1,19623.4 - & \log \eta_{25} = 1,37407 \\ \log \zeta_{25} = 0,68703.5 - & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \log \Omega = 0,18952.0 - 2 \\ x_1 = 0,33 \end{array}$$

III. $\varphi = 30^\circ$

$$\log c_1 = 0,69897 - 1 \quad \log c_2 = 0,93753 - 1$$

$$\begin{array}{ll} \log \lambda_1 = 0,51156 - 1 & \log \lambda_4 = 0,27300 - 1 \\ \log \lambda_2 = 0,63650 - 1 & \log \lambda_5 = 0,75012 - 1 \\ \log \lambda_3 = 0,03444 - 1 & \log \lambda_6 = 0,87506 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \varepsilon_{11} = 1,68986.7 - & \log \varepsilon_{23} = 1,67353.4 \\ \log \varepsilon_{12} = 1,33399 - & \log \varepsilon_{24} = 1,25861.6 \\ \log \varepsilon_{13} = 0,39693.4 - & \log \varepsilon_{25} = 0,67395.8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \zeta_{12} = 1,17449.5 & \log \eta_{24} = 3,65562 - \\ \log \zeta_{24} = 1,80349.5 - & \log \eta_{25} = 2,41144.6 \\ \log \zeta_{25} = 1,20572.3 - & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \log \Omega = 0,75582.6 - 2 \\ x_1 = 0,24 \end{array}$$

IV. $\varphi = 45^\circ$

$$\log c_1 = 0,84949 - 1 \quad \log c_2 = 0,84949 - 1$$

$$\begin{array}{ll} \log \lambda_1 = 0,39796 - 1 & \log \lambda_4 = 0,39796 - 1 \\ \log \lambda_2 = 0,69898 - 1 & \log \lambda_5 = 0,39796 - 1 \\ \log \lambda_3 = 0,39796 - 1 & \log \lambda_6 = 0,69898 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \varepsilon_{11} = 1,32570 - & \log \varepsilon_{24} = 1,33015 \\ \log \varepsilon_{12} = 1,32309 - & \log \varepsilon_{25} = 0,80692.3 \\ \log \varepsilon_{13} = 0,64506 - & \\ \log \varepsilon_{23} = 1,41359.8 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \zeta_{12} = 1,13529 - & \log \eta_{24} = 3,86577.5 - \\ \log \zeta_{24} = 1,94626 - & \log \eta_{25} = 2,66876.6 \\ \log \zeta_{25} = 1,33438.3 - & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \log \Omega = 0,80299.1 - 2 \\ x_1 = 0,43 \end{array}$$

Es hat sich also folgendes Resultat ergeben:

Neigung der einfallenden Strahlen zur opt. Achse	Entfernung des [M. B.] von der ersten Linsenfläche
0°	0,31
5°	0,32
15°	0,33
30°	0,24
45°	0,43

Für eine Winkelneigung der einfallenden Strahlen zur optischen Achse von $\varphi = 5^\circ$ beträgt also die Verschiebung des [M. B.] nur 1 % gegenüber der Lage des [M. B.] für achsenparallele Strahlen, bei einer Winkelneigung von $\varphi = 15^\circ$ beträgt die Verschiebung 2 %.

Es ergibt sich also das wichtige Resultat:

Geht man von solchen Strahlen, die mit der optischen Achse einen sehr kleinen Winkel bilden, zu Strahlen endlicher Neigung

über, so bleibt die Verschiebung des [M. B.] innerhalb sehr geringer Grenzen.

Diese Tatsache berechtigt dazu, für den wandernden Punkt einen festen anzunehmen und zwar denjenigen, der sich unter Voraussetzung achsenparalleler Strahlen ergibt.

Es war schon oben erwähnt, dass der Versuch, den Ort des [M. B.] bei einem beliebigen brechenden System unter Voraussetzung endlicher Strahlenneigungen zu bestimmen, auf unüberwindliche mathematische Schwierigkeiten stösst.

Das eben erhaltene Resultat berechtigt jedoch zu der Annahme, dass auch bei andern brechenden Systemen die Verschiebung des [M. B.] für verschiedene Strahlenneigungen eine geringe ist. Insbesondere wird dies bei unendlich dünnen Linsen der Fall sein. Es soll nun im folgenden Kapitel der Ort des [M. B.] für ein beliebiges brechendes System bestimmt werden.

Kapitel II.

Die natürliche Blende bei einem beliebigen brechenden System.

§ 1. Formeln zur Durchrechnung eines Strahles im Paraxialgebiet.

Eine Kugelfläche AB (Fig. 8) vom Radius r möge zwei Medien von dem Brechungssexponenten n und n' voneinander trennen. Im Objektraum befinde sich ein leuchtender Punkt P . Ist dann M der Krümmungsmittel-




Fig. 8

punkt der Kugel, so ist PM die optische Achse; sie möge die Kugelfläche in S schneiden. Gehen nun von P Strahlen aus unter kleiner Neigung zur optischen Achse, so entsteht in P' ein Bild von P . Setzt man

$$PS = a \text{ und } SP' = a',$$

so gilt für das parachbiale Gebiet bekanntlich die Beziehung:

$$\frac{n}{a} + \frac{n'}{a'} = \frac{n' - n}{r} (66)$$

Diese Formel lässt sich auf den Fall beliebig vieler brechender Flächen verallgemeinern. Der Einfachheit halber soll Gleichung (66) nur auf den Fall dreier brechender Flächen verallgemeinert werden.

Es sei der Brechungsexponent:

vor der ersten brech. Fläche n_1 ,

„ „ zweiten „ „ n_2 ,

„ „ dritten „ „ n_3 ,

hinter der ersten br. Fläche n_1' ,

„ „ zweiten „ „ n_2' ,

„ „ dritten „ „ n_3' .

Der Brechungsexponent eines und desselben Mediums ist also doppelt bezeichnet, und es ist:

$$n_1' = n_2$$

$$n_2' = n_3$$

$$n_3' = n_4$$

Ein Gegenstand y , im ersten Medium erzeugt nacheinander die Bilder y_2, y_3, y_4 . Die Entfernungen der einzelnen




Fig. 9

brechenden Flächen von einander sind d_1, d_2 . Die Radien der brechenden Flächen bezeichnen wir mit r_1, r_2, r_3 . (Fig. 9.)

Aus Gleichung (66) ergibt sich dann

$$\left. \begin{aligned} \frac{n_1}{a_1} + \frac{n_1'}{a_1'} &= \frac{n_1' - n_1}{r_1} \\ a_1' + a_2 &= d_1 \\ \frac{n_2}{a_2} + \frac{n_2'}{a_2'} &= \frac{n_2' - n_2}{r_2} \\ a_2' + a_3 &= d_2 \\ \frac{n_3}{a_3} + \frac{n_3'}{a_3'} &= \frac{n_3' - n_3}{r_3} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (67)$$

Es ist noch zu bemerken, dass in (67) die Radien der brechenden Flächen mit positivem oder negativem Vorzeichen zu nehmen sind, je nachdem die brechende Fläche ihre konvexe oder konkave Seite dem einfallenden Lichte zuwendet. In (67) sind von den Scheiteln der brechenden Flächen aus die Schnittweiten im Objektraum nach links, im Bildraum nach rechts positiv genommen. Zum Zweck der späteren Anwendung zur numerischen Berechnung sollen nun die Schnittweiten vor und nach der Brechung im Sinne der Lichtrichtung positiv, im entgegengesetzten Sinne negativ gerechnet werden.

In dieser Weise ausgedrückt werden die Schnittweiten in (67), wenn man die Zeichen a zur Vermeidung von Irrtümern durch die Zeichen c ersetzt:

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= -c_1 \\ a_1' &= c_1' \\ a_2 &= -c_2 \\ a_2' &= c_2' \\ a_3 &= -c_3 \\ a_3' &= c_3' \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (68)$$

Wendet man (67) mit Berücksichtigung von (68) auf eine Brechung an der $(z-1)^{\text{ten}}$ und z^{ten} Fläche eines Systems von beliebig vielen brechenden Flächen an, so ergibt sich:

$$\left. \begin{aligned} \frac{n'_{z-1}}{c'_{z-1}} - \frac{n_{z-1}}{c_{z-1}} &= \frac{n'_{z-1} - n_{z-1}}{r_{z-1}} \\ c_z &= c'_{z-1} - d_{z-1} \\ \frac{n'_z}{c'_z} - \frac{n_z}{c_z} &= \frac{n'_z - n_z}{r_z} \end{aligned} \right\} \quad . \quad (69)$$

Sind von einem System aus z brechenden Kugelflächen die Radien, Dicken und Brechungsexponenten gegeben, und kennt man ausserdem die Grösse c_1 , d. h. die Entfernung des Objektes von der ersten brechenden Fläche, so kann man nach (69) die letzte Schnittweite c'_z berechnen.

§ 2. Formeln zur Durchrechnung eines Meridionalstrahles.

Das Gleichungssystem (69) gilt wie erwähnt nur für Strahlen, die in unmittelbarer Nähe der optischen Achse verlaufen. Es soll nun ein Gleichungssystem für Meridionalstrahlen aufgestellt werden.

Es sei in Fig. 10 eine brechende Kugelfläche mit dem Radius r und dem Mittelpunkt M dargestellt. Soll die objektseitige Schnittweite positiv gerechnet werden, und fällt das Licht von links auf die Fläche, so muss der Objektpunkt A rechts von der Kugelfläche angenommen werden. Ein nach A hingehendes unendlich dünnes Strahlenbündel möge die Kugelfläche in den Punkten P und Q schneiden. Es sei das Bogenelement $PQ = ds$. Man ziehe PM und QM und setze $\angle QMP = d\varphi$. Ferner sei die Schnittweite $QA = t$.

Dividiert man (70) durch $d\varphi$, so ergibt sich:

$$1 = \frac{di}{d\varphi} + \frac{du}{d\varphi} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (74)$$

Aus den Gleichungen (71) und (72) folgt:

$$ds \cdot \cos i = t \cdot du \quad (75)$$

Aus den Gleichungen (75) und (73) folgt:

$$r \cdot d\varphi \cdot \cos i = t \cdot du \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (76)$$

oder

$$\frac{du}{d\varphi} = \frac{r \cdot \cos i}{t} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (77)$$

Aus den Gleichungen (74) und (77) folgt:

$$\frac{r \cdot \cos i}{t} = 1 - \frac{di}{d\varphi} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (78)$$

Daraus folgt:

$$\frac{di}{r \cdot d\varphi} = \frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (79)$$

Multipliziert man diese Gleichung mit $n \cdot \cos i$, so folgt:

$$\frac{n \cdot \cos i \, di}{r \cdot d\varphi} = n \cdot \cos i \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) \quad . \quad . \quad . \quad (80)$$

oder

$$n \cos i \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) = \frac{d(n \cdot \sin i)}{r \cdot d\varphi} \quad . \quad . \quad . \quad (81)$$

Punkt A (Fig. 10) sei der leuchtende Punkt, nach dem die Strahlen hingehen. Sie werden in P und Q gebrochen.

Nach der Brechung muss man setzen:

$$\begin{array}{l} n' \text{ für } n \\ i' \quad \text{ „ } i \\ t' \quad \text{ „ } t, \end{array}$$

dagegen bleiben r und φ unverändert. Für das gebrochene Bündel erhält man also analog zu Gleichung (81):

$$n' \cos i' \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i'}{t'} \right) = \frac{d(n' \sin i')}{r \cdot d\varphi}.$$

Unter Berücksichtigung des Brechungsgesetzes von Snellius folgt hieraus:

$$n' \cos i' \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i'}{t'} \right) = \frac{d(n \sin i)}{r \cdot d\varphi} \quad . \quad . \quad . \quad (82)$$

Aus den Gleichungen (81) und (82) folgt:

$$n \cos i \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) = n' \cos i' \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i'}{t'} \right) \quad . \quad . \quad (83)$$

Aus dieser Formel kann die Schnittweite t' nach der Brechung berechnet werden, wenn die Entfernung t des leuchtenden Punktes sowie der Einfalls- und Brechungswinkel bekannt sind.

Bemerkt sei noch, dass für ein Meridionalbündel von beliebiger Neigung der Helmholtz-Lagrangesche^{1 9 10} Satz gilt.

§ 3. Die Koma und die Bedingung der Komafreiheit.

Geht ein Strahl von einem Medium mit dem Brechungsexponenten n zu einem andern mit dem Brechungsexponenten n' über und ist der Einfalls- bzw. Brechungswinkel i und i' , dann ist bekanntlich

$$Q = n \cdot \sin i = n' \sin i' \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (84)$$

9. A. Gleichen, Lehrbuch der geometrischen Optik.

10. Winkelmann, Handbuch der Physik. 6 Bd. Optik.

eine optische Invariante. Differentiiert man diese Gleichung nach φ , so erhält man

$$\frac{dQ}{d\varphi} = n \cos i \frac{di}{d\varphi} \dots \dots \dots (85)$$

Mit Rücksicht auf Gleichung (79) ergibt sich hieraus:

$$\frac{1}{r} \frac{dQ}{d\varphi} = n \cos i \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) \dots \dots \dots (86)$$

Diese Grösse ist wieder eine optische Invariante; man setze

$$Q^I = n \cos i \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) \dots \dots \dots (87)$$

durch Differentiation entsteht hieraus:

$$\begin{aligned} \frac{dQ^I}{d\varphi} = & - \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) n \cdot \sin i \cdot \frac{di}{d\varphi} - n \cos i \frac{\partial \frac{\cos i}{t}}{\partial i} \cdot \frac{di}{d\varphi} \\ & - n \cos i \frac{\partial \frac{\cos i}{t}}{\partial t} \cdot \frac{dt}{d\varphi}. \end{aligned}$$

Zufolge der Gleichung (79) entsteht hieraus

$$\begin{aligned} \frac{dQ^I}{d\varphi} = & - r \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right)^2 n \cdot \sin i + n \cos i \cdot \frac{\sin i}{t} \cdot \frac{di}{d\varphi} \\ & + \frac{n \cos^2 i}{t^2} \cdot \frac{dt}{d\varphi} \end{aligned}$$

und weiter:

$$\begin{aligned} \frac{dQ^I}{d\varphi} = & - r \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right)^2 \cdot n \cdot \sin i \\ & + n \cdot \cos i \cdot r \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) \cdot \frac{\sin i}{t} + \frac{n \cos^2 i}{t^2} \cdot \frac{dt}{d\varphi} \end{aligned}$$

$$AC = BC = CD = d\tau$$

$$CU = dl$$

$$PQ = RQ = ds$$

$$\sphericalangle PAQ = du$$

$$\sphericalangle PMQ = d\varphi$$

$$\sphericalangle EQP = i$$

Bekanntlich schneiden sich die drei benachbarten Meridionalstrahlen nicht in einem Punkte sondern bilden das Stück einer kaustischen Linie, das man mit dem Namen „Koma“ bezeichnet. Als Veranlassung dieser Komabildung kann man das kleine Dreieck ABC ansehen. Gehen wir aus von dem Bündel $PA = t$, so müssen wir, wie schon oben erwähnt, dem benachbaten Bündel QB die Schnittweite $t + dt$ geben. Projizieren wir QB auf PA , so ist:

$$t + dt = QB = ED : \cos du$$

Da der Winkel du sehr klein ist, sein Kosinus also der Eins sehr nahe kommt, so können wir statt QB auch ED setzen. Nun ist, wie sich aus der Figur 11 ergibt:

$$PA = PE + ED + DC + CA$$

oder:

$$t = PE + (t + dt) + d\tau + d\tau.$$

In dem Dreieck PQE ist:

$$PE = ds \cdot \sin i$$

und im Dreieck QPM

$$ds = r \cdot d\varphi$$

also wird

$$PE = r \cdot d\varphi \cdot \sin i$$

und die obige Gleichung für t wird:

$$t = r \cdot d\varphi \cdot \sin i + t + dt + 2d\tau.$$

Hieraus folgt, wenn man noch durch du dividiert:

$$\frac{dt}{du} = -2 \frac{d\tau}{du} - r \cdot \sin i \frac{d\varphi}{du}.$$

Mit Rücksicht auf Gleichung (76) folgt:

$$\frac{dt}{du} = -2 \frac{d\tau}{du} - \frac{t \sin i}{\cos i} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (89)$$

Aus Gleichung (88) folgt dann wenn man diesen Wert für $\frac{dt}{du}$ einführt und noch durch r dividiert:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{r} \cdot \frac{dQ^I}{d\varphi} &= -Q \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right)^2 + QQ^I \cdot \frac{1}{nt} \\ &+ \frac{n \cos^3 i}{t^3} \left(-2 \frac{d\tau}{du} - \frac{t \sin i}{\cos i} \right) = -\frac{Q}{r^2} + \frac{2Q \cos i}{rt} \\ &- \frac{Q \cos^2 i}{t^2} + \frac{QQ^I}{nt} - \frac{2n \cos^3 i}{t^3} \cdot \frac{d\tau}{du} - \frac{n \sin i \cos^2 i}{t^2} \\ &= -\frac{Q}{r^2} + \frac{2Qn \cos i}{nt} \left(\frac{1}{r} - \frac{\cos i}{t} \right) \\ &+ \frac{QQ^I}{nt} - \frac{2n \cos^2 i}{t^3} \frac{d\tau}{du} \end{aligned} \right\} \quad (90)$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (87):

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{dQ^I}{d\varphi} = -\frac{Q}{r^2} + \frac{3QQ^I}{nt} - \frac{2n \cos^3 i}{t^3} \cdot \frac{d\tau}{du} \quad (91)$$

Wären wir von der Gleichung

$$Q = n' \sin i'$$

ausgegangen, so wären wir zu einer ganz analogen wie (91) gekommen, in der an Stelle der Grössen $n, t, d\tau, du, i$ die Grössen $n', t', d\tau', du', i'$ auftreten würden, während die Grössen r und $d\varphi$ unverändert geblieben wären. Diese neue Gleichung würde sich dann also auf das gebrochene Bündel beziehen. Der Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung (91) ist also eine optische Invariante. Man hat also auch:

$$\frac{1}{r} \frac{dQ^I}{d\varphi} = -\frac{Q}{r^2} + \frac{3QQ^I}{n't'} - \frac{2n' \cos^3 i'}{t'^3} \cdot \frac{du'}{d\tau'} \quad (92)$$

Wenden wir jetzt auf die Gleichungen (91) und (92) die Abbesche Schreibweise an, so ergibt sich, nachdem wir die rechten Seiten gleichgesetzt haben:

$$\mathcal{A} \left(\frac{n \cos^3 i}{t^3} \cdot \frac{d\tau}{du} \right) = \frac{3}{2} QQ^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right) \quad (93)$$

Nun ist weiter nach Fig. 11:

$$dl = d\tau \cdot du$$

oder

$$\frac{d\tau}{du} = \frac{dl}{du^2} \quad (94)$$

Aus dieser Gleichung folgt, dass dl unendlich klein vom zweiten Grade ist, da $d\tau$ und du unendlich klein vom ersten Grade sind.

Nach den Gleichungen (76) und (73) ist:

$$\frac{\cos i}{t} = \frac{du}{r \cdot d\varphi} = \frac{du}{ds} \quad (95)$$

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt:

$$\frac{n \cdot \cos^3 i}{t^3} \cdot \frac{d\tau}{du} = n \left(\frac{du}{ds} \right)^3 \frac{dl}{du^2} = \frac{1}{ds^3} \cdot n du \cdot dl \quad (96)$$

demnach wird Gleichung (93):

$$\mathcal{A} \left(\frac{n du dl}{ds^3} \right) = {}^{3/2} QQ^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right) \quad (97)$$

oder, da ds vor und nach der Brechung dasselbe ist:

$$\frac{1}{ds^3} \mathcal{A} (n du dl) = {}^{3/2} QQ^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right) \quad (98)$$

Es war schon oben erwähnt, dass man als Mass der Koma das unendlich kleine Dreieck ansehen kann, das von den drei benachbarten Strahlen gebildet wird. Die Koma verschwindet also, wenn der Inhalt des Dreiecks Null wird. Für eine einzige brechende Fläche würde also die Bedingung der Komafreiheit sein:

$$dl = 0.$$

Es soll nun auch die Bedingung der Komafreiheit für ein System von beliebig vielen brechenden Flächen ermittelt werden.

Die Gleichung (93) gelte für die Brechung an einer, z. B. der x^{ten} Fläche des Systems, dann müssen alle Grössen den Index x erhalten:

$$\frac{1}{ds_x^3} \mathcal{A} (n du dl)_x = {}^{3/2} Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x \quad (99)$$

Nach unsern Definitionen ist:

$$\mathcal{A} (n du dl)_x = n'_x du'_x dl'_x - n_x du_x dl_x$$

oder da für jeden Wert von x

$$n'_x = n_x + 1$$

ist, so wird:

$$\mathcal{A}(n \, du \, dl)_x = n_{x+1} \, du'_x \cdot dl'_x - n_x \, du_x \, dl_x \quad (100)$$

Wir fassen nun dl'_x für einen Augenblick als unendlich kleines Objekt auf. Es liegt allerdings nicht streng im Bildpunkt des in Frage kommenden unendlich dünnen Meridionalbündels, aber es liegt ihm doch unendlich nahe. Da der Helmholtz-Lagrangesche Satz auch für beliebig geneigte meridionale Bündel gilt (siehe oben), so ist:

$$n_{x+1} \, du'_x \cdot dl'_x = n_1 \, du_1 \, dl_1 \quad (101)$$

wo n_1 und u_1 Brechungsexponent und halbe Oeffnung des Bündels im ersten Medium sind.

Wendet man dieselben Betrachtungen auf die Grösse dl_x an, so wird:

$$n_x \, du_x \, dl_x = n_1 \, du_1 \, d\lambda_1 \quad . \quad . \quad . \quad (102)$$

Hierin haben n_1 und du_1 dieselbe Bedeutung wie oben; $d\lambda_1$ ist diejenige Objektgrösse, welcher vor der Brechung gerade die Bildgrösse dl_x entspricht.

Setzt man die Grössen (101) und (102) in (100) ein, so erhält man:

$$\mathcal{A}(n \, du \, dl)_x = n_1 \, du_1 \, dl_1 - n_1 \, du_1 \, d\lambda_1,$$

oder wenn man noch setzt:

$$\begin{aligned} dl_1 - d\lambda_1 &= \delta(l): \\ \mathcal{A}(n \, du \, dl)_x &= n_1 \, du_1 \, \delta(l) \quad . \quad . \quad . \quad (103) \end{aligned}$$

Die Gleichung (99) geht dann über in:

$$\frac{1}{ds_x^3} n_1 du_1 \delta(l) = {}^{3/2} Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x \quad (104)$$

woraus sich ergibt:

$$\delta(l) = {}^{3/2} \frac{ds_x^3}{n_1 du_1} Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x.$$

Erweitert man die rechte Seite dieser Gleichung mit $(n_1 du_1)^2$, so erhält man:

$$\delta(l) = {}^{3/2} (n_1 du_1)^2 \left(\frac{ds_x}{n_1 du_1} \right)^3 Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x \quad (105)$$

Nach Gleichung (75) ist:

$$du_1 = \frac{ds_1 \cos i_1}{t_1}$$

Folglich wird Gleichung (105):

$$\delta(l) = {}^{3/2} (n_1 du_1)^2 \left(\frac{t_1}{n_1 \cos i_1} \right)^3 \left(\frac{ds_x}{ds_1} \right)^3 Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x \quad (106)$$

In Fig. 12 sind zwei beliebige brechende Flächen eines Systems z. B. die $(x-1)^{te}$ und die x^{te} dargestellt.




Fig. 12

Das an der $(\kappa-1)^{\text{ten}}$ Fläche gebrochene Bündel sei PQA' mit dem Bildpunkte A' . Dieses Bündel möge die zweite Fläche in $P'Q'$ treffen. Die von Q und Q' auf den Strahl PA' gefällten Lote seien QE und $Q'E'$. Wendet man die bisher gebrauchten Bezeichnungen jetzt an, so wird:

$$\sphericalangle PQE = i'_{\kappa-1}$$

$$\sphericalangle P'Q'E' = i_{\kappa}.$$

Ferner folgt aus der Figur:

$$QE = ds_{\kappa-1} \cdot \cos i'_{\kappa-1}$$

$$Q'E' = ds_{\kappa} \cdot \cos i_{\kappa}$$

$$\frac{Q'E'}{QE} = \frac{t_{\kappa}}{t'_{\kappa-1}} = \frac{ds_{\kappa} \cos i_{\kappa}}{ds_{\kappa-1} \cdot \cos i'_{\kappa-1}}$$

oder

$$\frac{ds_{\kappa}}{ds_{\kappa-1}} = \frac{t_{\kappa}}{t'_{\kappa-1}} \cdot \frac{\cos i'_{\kappa-1}}{\cos i_{\kappa}} \quad \dots \quad (107)$$

denn $QA' = PA'$ sind ja unendlich nahe Strahlen, also kann

$$PA' = QA' = t'_{\kappa-1}$$

und

$$P'A' = Q'A' = t_{\kappa}$$

gesetzt werden.

Die Gleichung (107) gilt stets für zwei aufeinander folgende Brechungen. Durch sukzessive Anwendung dieser Gleichung findet man:

$$\frac{ds_x}{ds_1} = \frac{t_x}{t'_x - 1} \cdot \frac{t_{x-1}}{t'_{x-2}} \cdot \dots \cdot \frac{t_2}{t_1} \cdot \frac{\cos i'_{x-1}}{\cos i_x} \cdot \frac{\cos i'_{x-2}}{\cos i_{x-1}} \cdot \dots \cdot \frac{\cos i'_1}{\cos i_2} \quad (108)$$

Sind also in dem Bündel die Schnittweiten t und die Winkel i und i' etwa durch trigonometrische Rechnung bestimmt, so dient die Gleichung (108) zur Bestimmung von $\frac{ds_x}{ds_1}$, wodurch dann der Ausdruck unter (106) berechenbar ist.

Die Grösse $\delta(l)$ in Gleichung (106) stellt die Verschlechterung dar, die an dem Bilde unter dem Einflusse der Komawirkung durch die x^{te} Fläche hervorgebracht wird. Man kann nach dieser Formel die Verschlechterung für jede einzelne brechende Fläche sofort hinschreiben, indem man in Gleichung (106) für x alle ganzen Zahlen von 1 bis λ setzt.

Damit die Summe dieser Verschlechterungen verschwindet, in dem betrachteten Bündel also die Koma aufgehoben ist, hat man also für Objekte in endlicher wie auch in unendlicher Entfernung nach Unterdrückung konstanter Faktoren die Bedingung:

$$\sum_{x=1}^{x=\lambda} \left(\frac{ds_x}{ds_1} \right)^3 Q_x Q_x^I \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_x = 0, \quad \dots \quad (109)$$

eine Gleichung, die schon Herr Gleichen¹ entwickelt hat.

Hat man also im Objektraum einen beliebigen leuchtenden Punkt, von dem im Hauptschnitt unendlich viele meridionale Strahlenbündel ausgehen, die ein beliebiges zentriertes System von λ brechenden Flächen durchdringen, so gilt Gleichung (109) für denjenigen Strahl, der nach der Brechung durch einen komafreien Punkt geht,

d. h. durch einen Punkt, in dem sich drei benachbarte Strahlen streng vereinigen. Wie schon oben erwähnt, ist dieser Punkt identisch mit der Spitze der Kaustik, die von der Gesamtheit der gebrochenen Strahlen gebildet wird. Mit anderen Worten: Gleichung 109 gilt für den Fundamentalstrahl.

Entwickelt man die auftretenden Sinusse und Kosinusse in Reihen, vernachlässigt alle höheren Potenzen als die zweiten, und fordert man, dass die so umgeformte Gleichung für alle Strahlenbündel von der angenommenen geringen Neigung gilt, so gelangt man zu einer Beziehung zwischen den Konstanten des brechenden Systems, die von Seidel 1855 aufgestellt wurde, und die er „Fraunhofersche Bedingung“ nannte, da sie von Fraunhofer schon im Jahre 1825 in dem berühmten Königsberger Heliometerobjektiv erfüllt wurde. Später haben dann Seidel¹¹ und Kerber¹² gezeigt, dass die Fraunhofersche Bedingung in einem sphärisch korrigierten Linsensystem bei Beschränkung auf Aberrationen dritter Ordnung mit der Sinusbedingung übereinstimmt.

Wir gehen jedoch auf die Umformung dieser Bedingung nicht näher ein, sondern benutzen Gleichung (109) zur Ermittlung des Ortes des [M. B.].

§ 4. Umformung der Bedingung für die Komafreiheit auf Parachialstrahlen.

Wir wollen jetzt unter Voraussetzung achsennaher Strahlen denjenigen Punkt suchen, durch den die Fundamentalstrahlen gehen. Sollen die in (109) auftretenden Grössen nur für das parachsiale Gebiet gelten, so kann man die Kosinusse der Neigungen gleich den zugehörigen

11. L. Seidel, Ber. Münch. Ak. d. Wissensch. 28. 395. 1898.

12. A. Kerber, Beiträge zur Dioptrik.

Bögen setzen. Es sollen nun die einzelnen in den Summanden der Gleichung (109) auftretenden Faktoren für das Parachialgebiet umgeformt werden.

Zufolge Gleichung (108) wird, wenn man statt der Schnittweiten t jetzt die parachsialen Schnittweiten c (siehe oben) einführt:

$$\frac{ds_z}{ds_1} = \frac{c_z \cdot c_{z-1} \dots c_2}{c'_z \cdot c'_{z-1} \dots c'_1} = A_z, \quad (110)$$

indem zur Abkürzung das Symbol A_z eingeführt wird.

Die Grösse $Q_z = n_z \sin i_z = n'_z \cdot \sin i'_z$ wird jetzt $n_z i_z = n'_z i'_z$. Der Ausdruck Q_z^1 geht in die sog. Nullinvariante über, und wir setzen

$$n'_z \left(\frac{1}{r_z} - \frac{1}{c'_z} \right) = n_z \left(\frac{1}{r_z} - \frac{1}{c_z} \right) = Q_z^1 = Q_{zc}, \quad (111)$$

wo der Index c an Q_{zc} darauf hinweisen soll, dass die parachsialen Schnittweiten in Frage kommen.

Der Ausdruck $\mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_z$ geht über in

$$\mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_z = \frac{1}{n'_z c'_z} = \frac{1}{n_z c_z} =: B_z. \quad (112)$$

Führt man diese Grössen ein, so geht Gleichung (109) über in:

$$\sum_{z=1}^x \left(\frac{ds_z}{ds_1} \right)^3 Q_z^1 \mathcal{A} \left(\frac{1}{nt} \right)_z \cdot n_z i'_z = 0$$

oder:

$$\sum_{z=1}^x A_z^3 B_z Q_{zc} n_z i'_z = 0 \quad (113)$$

den Fundamentalstrahl vor, also denjenigen, der im Objekt-
raum durch den Mittelpunkt B der natürlichen Blende
geht. Es sei $AM = r_{\kappa} = S_{\kappa}M$ der Radius der κ^{ten} Fläche
und MAN das Einfallslot.

Wir setzen, da wir uns im parachsialen Gebiet be-
finden:

$$AB = S_{\kappa}B = x_{\kappa}, \quad \sphericalangle PAN = i_{\kappa} = \sphericalangle BAM$$

$$AS_{\kappa} = j_{\kappa}, \quad \sphericalangle AMS_{\kappa} = \varphi_{\kappa}, \quad \sphericalangle PBS_{\kappa} = u_{\kappa}$$

Hierbei ist zu bemerken, dass j_{κ} eine sehr kleine
achsensenkrechte Strecke ist.

Es ist nun:

$$i_{\kappa} = \varphi_{\kappa} - u_{\kappa}$$

$$\varphi_{\kappa} = \frac{j'_{\kappa}}{r_{\kappa}}, \quad u_{\kappa} = \frac{j'_{\kappa}}{x_{\kappa}}$$

Folglich:

$$n_{\kappa} \cdot i'_{\kappa} = j_{\kappa} \left(\frac{1}{r_{\kappa}} - \frac{1}{x_{\kappa}} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (114)$$

Die Invariante $n_{\kappa} i_{\kappa}$ stellt sich also dar als die oben
angegebene Nullinvariante

$$Q_{\kappa x} = n_{\kappa} \left(\frac{1}{r_{\kappa}} - \frac{1}{x_{\kappa}} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (115)$$

multipliziert noch mit der zugehörigen Einfallshöhe j_{κ} , so-
dass man hat:

$$n_{\kappa} i'_{\kappa} = j_{\kappa} Q_{\kappa x} \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (116)$$

Gleichung (113) wird demnach:

$$\sum_{x=1}^{x=\lambda} A^3_x B_x Q_{xc} Q_{xx} j_x = 0 \quad . . . \quad (117)$$

In Gleichung (117) treten also zwei verschiedene Nullinvarianten auf, deren Bedeutung noch einmal näher erläutert werden soll.

In Fig. 14 sei ein brechendes System zentrierter Kugelflächen dargestellt. PQ sei ein achsensenkrechtcs Objekt vor dem System. Selbst wenn wir uns auf achsennahe Strahlen beschränken, so gehen von Q doch unendlich viele Strahlen aus, die allerdings innerhalb eines Raumwinkels von geringer Oeffnung verlaufen.




Fig. 14

Einer von ihnen ist der Fundamentalstrahl d. h. derjenige Strahl, der im Bildraum durch die Spitze Q' der Kaustik geht. Der Punkt B ist der Mittelpunkt der natürlichen Blende im Objektraum. Die in Gleichung (117) auftretende Nullinvariante Q_{xc} gehört dann zu dem vom Fusspunkt P des Objektes PQ ausgehenden Strahl, während die andere Nullinvariante Q_{xx} dem von Q ausgehenden Fundamentalstrahl angehört, sodass also in Fig. 14 $BS = x_1$ die erste Schnittweite wäre.

§ 6. Die Seidel'schen Sätze über Nullinvarianten.

Für zwei Strahlen, die ein System brechender Flächen im paraxialen Gebiet durchlaufen, seien die beiden Nullinvarianten

$$Q_{zx} = n'_x \left(\frac{1}{r_x} - \frac{1}{x'_x} \right) = n_x \left(\frac{1}{r_x} - \frac{1}{x_x} \right) \quad . \quad (118)$$

$$Q_{zc} = n'_x \left(\frac{1}{r_x} - \frac{1}{c'_x} \right) = n_x \left(\frac{1}{r_x} - \frac{1}{c_x} \right) \quad . \quad (119)$$

Folglich ist:

$$Q_{zx} - Q_{zc} = n'_x \left(\frac{1}{c'_x} - \frac{1}{x'_x} \right) = n_x \left(\frac{1}{c_x} - \frac{1}{x_x} \right) \quad . \quad (120)$$

Infolge sinngemässer Anwendung der zweiten der Gleichungen (69) ergibt sich:

$$c_x = c'_{x-1} - d_{x-1}, \quad x_x = x'_{x-1} - d_{x-1} \quad . \quad (121)$$

Ferner ist

$$n_x = n'_{x-1}$$

Man erhält also:

$$\left. \begin{aligned} Q_{zx} - Q_{zc} &= n'_{x-1} \left(\frac{1}{c'_{x-1} - d_{x-1}} - \frac{1}{x'_{x-1} - d_{x-1}} \right) \\ &= \frac{n'_{x-1} \cdot c'_{x-1} - x'_{x-1} (x'_{x-1} - c'_{x-1})}{c'_{x-1} \cdot x'_{x-1} \cdot c_x \cdot x_x} \\ &= \frac{c'_{x-1} \cdot x'_{x-1}}{c_x \cdot x_x} (Q_{x-1, x} - Q_{x-1, c}) \end{aligned} \right\} \quad (122)$$

Der Strahl mit den Schnittweiten c_x möge die x^{te} Fläche n der Höhe h_x über der Achse schneiden, während die

analoge Grösse für den Strahl mit den Schnittweiten x_x durch j_x ausgedrückt sei. Dann besteht die Proportion:

$$\frac{c'_{x-1}}{c_x} = \frac{h_{x-1}}{h_x}, \quad \frac{x'_{x-1}}{x_x} = \frac{j_{x-1}}{j_x}.$$

Gleichung (122) wird dann:

$$Q_{xx} - Q_{xc} = \frac{j_{x-1} \cdot h_{x-1}}{j_x \cdot h_x} (Q_{x-1}, x - Q_{x-1}, c) \quad (123)$$

Analog würde sich ergeben:

$$Q_{x-1}, x - Q_{x-1}, c = \frac{j_{x-2} \cdot h_{x-2}}{j_{x-1} \cdot h_{x-2}} (Q_{x-2}, x - Q_{x-2}, c).$$

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt:

$$Q_{xx} - Q_{xc} = \frac{j_{x-2} \cdot h_{x-2}}{j_x \cdot h_x} (Q_{x-2}, x - Q_{x-2}, c).$$

Führt man in dieser Weise fort, so erhält man schliesslich:

$$Q_{xx} - Q_{xc} = \frac{j_1 h_2}{j_x h_x} (Q_{1x} - Q_{1c}) \quad \dots \quad (124)$$

Ein zweiter von Seidel entwickelter Satz ergibt sich folgendermassen:

In Figur 13 ziehe man AC achsenparallel zwischen der $(x-1)^{\text{ten}}$ und der x^{ten} Fläche. Dann ist:

$$CP = h_{x-1} - h_x, \quad AC = d_{x-1}$$

Aus ähnlichen Dreiecken folgt:

$$\frac{h_{x-1} - h_x}{h_{x-1}} = \frac{d_{x-1}}{c'_{x-1}}$$

Analog ergibt sich für den Strahl mit den Schnittweiten x :

$$\frac{j_{x-1} - j_x}{j_{x-1}} = \frac{x'_{x-1}}{d_{x-1}}.$$

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt:

$$\frac{h_x}{h_{x-1}} - \frac{j_x}{j_{x-1}} = d_{x-1} \left(\frac{1}{x'_{x-1}} - \frac{1}{c'_{x-1}} \right).$$

Multipliziert man diese Gleichung mit $\frac{j_{x-1}}{h_x}$ und berücksichtigt Gleichung (120), nachdem man den Index x durch $x-1$ ersetzt hat, so ergibt sich:

$$\frac{j_x}{h_x} - \frac{j_{x-1}}{h_{x-1}} = d_{x-1} \frac{j_{x-1}}{h_x} (Q_{x-1}, x - Q_{x-1}, c) \frac{1}{n'_{x-1}}.$$

Oder unter Benutzung von Gleichung (124).

$$\frac{j_x}{h_x} = \frac{j_{x-1}}{h_{x-1}} + h_1 j_1 (Q_1, x - Q_1, c) \frac{d_{x-1}}{h_{x-1} \cdot h_x \cdot n_x}.$$

Denkt man sich die letzte Gleichung für alle Indizes von $\lambda = 2, 3 \dots x-1$, x hingeschrieben und addiert, so wird:

$$\frac{j_x}{h_x} = \frac{j_1}{h_1} + h_1 j_1 (Q_1, x - Q_1, c) \sum_{\lambda=2}^{\lambda=x} \frac{d_{\lambda-1}}{h_{\lambda-1} h_{\lambda} \cdot n_{\lambda}} \quad (125)$$

§ 7. Bestimmung des Ortes der natürlichen Blende im Objektraum.

Mittels der beiden Seidelschen Sätze, Gleichung (124) und (125) gelingt nun die Bestimmung auf folgende Weise:
Man setze der Kürze halber:

$$Q_{1X} - Q_{1C} = z \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (126)$$

Der Ausdruck $\frac{h_x}{h_1}$ ist identisch mit dem durch Gleichung (110) definierten Symbol A_x , sodass man also hat:

$$\frac{h_x}{h_1} = A_x \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (127)$$

Aus Gleichung (124) erhält man dann:

$$j_x A_x Q_{xx} - j_x A_x Q_{xc} = j_1 z \quad . \quad . \quad . \quad (128)$$

Multipliziert man Gleichung (125) mit $\frac{h_x}{j_1}$, so ergibt sich

$$\frac{j_x}{j_1} = A_x + A_x \cdot z \cdot \sum_{\lambda=2}^{\lambda=x} \frac{d_{\lambda-1}}{n_\lambda A_{\lambda-1} A_\lambda}.$$

Setzt man

$$\sum_{\lambda=2}^{\lambda=x} \frac{d_{\lambda-1}}{n_\lambda A_{\lambda-1} A_\lambda} = C_x, \quad . \quad . \quad . \quad (128 a)$$

so wird:

$$\frac{j_x}{j_1} = A_x + A_x \cdot z \cdot C_x \quad . \quad . \quad . \quad (129)$$

Aus den Gleichungen (128) und (125) folgt:

$$\frac{j_x \cdot A_x \cdot Q_{xx}}{j_1} - (A_x + A_x z \cdot C_x) A_x Q_{xc} = z$$

oder:

$$\frac{j_{\kappa}}{j_1} A_{\kappa} \cdot Q_{\kappa\kappa} = A_{\kappa}^2 Q_{\kappa\kappa} + z (1 + A_{\kappa}^2 C_{\kappa} Q_{\kappa\kappa}) .$$

Diesen Wert für $\frac{j_{\kappa}}{j_1} A_{\kappa} Q_{\kappa\kappa}$ in Gleichung (117) eingesetzt, nachdem diese durch die in Bezug auf κ konstante Grösse j_1 dividiert worden ist, ergibt:

$$\sum A_{\kappa}^2 B_{\kappa} Q_{\kappa\kappa} [A_{\kappa}^2 Q_{\kappa\kappa} + z (1 + A_{\kappa}^2 C_{\kappa} Q_{\kappa\kappa})] = 0 \quad (130)$$

wo die Summierung von $\kappa = 1$ bis $\kappa = m$ auszudehnen ist, wenn das System aus m brechenden Flächen besteht. Diese Gleichung ist schon von Herrn Gleichen entwickelt worden¹⁹. Die Gleichung (130) ist linear in Bezug auf die Unbekannte z . Ist die letztere bestimmt, so folgt $Q_{1\kappa}$ aus Gleichung (126) und dann die gesuchte Entfernung x_1 des [M. B.] im Objektraum aus der Gleichung:

$$Q_{1,\kappa} = n_1 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{x_1} \right) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (131)$$

Aus den Gleichungen (126) und (131) folgt:

$$n_1 \left(\frac{1}{c_1} - \frac{1}{x_1} \right) = z \quad : \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (132)$$

Für $c_1 = \infty$ und $n_1 = 1$ folgt aus der Gleichung (132).

$$x_1 = -\frac{1}{z}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (133)$$

eine Gleichung, die später noch oft Anwendung finden wird.

Die in Gleichung (130) auftretenden Grössen A_{κ} , B_{κ} , $Q_{\kappa\kappa}$, C_{κ} sind bestimmt durch die Gleichungen (110), (112),

(111), (128a). Zu bemerken ist noch, dass das Symbol C_1 den Wert Null, das Symbol A_1 den Wert Eins hat.

§ 8. Ein einfaches Beispiel.

Es soll nun an einem einfachen Beispiel gezeigt werden, wie mit Hilfe der Gleichung (130) die Berechnung des Ortes des [M. B.] im Objektraum vor sich geht.

Bevor jedoch die Durchrechnung vorgenommen wird, soll aus Gründen der Zweckmässigkeit eine Aenderung in der Schreibweise eingeführt werden. Man könnte allerdings die bisher gebrauchte Schreibweise auch weiter anwenden, jedoch erscheint sie zur praktischen Verwendung nicht geeignet insbesondere dadurch, dass an einer und derselben Grösse sich zwei Indizes befinden, denn wird z. B. der obere aus Versehen einmal weggelassen, so wird die betr. Grösse mit einer andern scheinbar identisch, was die Entstehung weiterer Fehler erleichtert.

Wir setzen deshalb für die parachsialen Schnittweiten:

$$\begin{array}{ll}
 c_1 = p_0 & c'_1 = p' \\
 c_2 = p_1 & c'_2 = p'' \\
 c_3 = p_2 & c'_3 = p''' \\
 \text{usw.} & c'_4 = p'''' \text{ od. } p^4 \\
 \text{allgemein} & \text{usw.} \\
 c_x = p_{x-1} & \text{allgemein} \\
 & c'_x = p^{(x)}
 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} c_1 = p_0 \\ c_2 = p_1 \\ c_3 = p_2 \\ \text{usw.} \\ \text{allgemein} \\ c_x = p_{x-1} \end{array}} \right\} . \quad (134)$$

Bei einer grösseren Anzahl brechender Flächen ersetzt man die Striche oben durch Zahlen, da eine Verwechslung mit einer Potenz ausgeschlossen ist. Die Radien der brechenden Flächen werden der Reihe nach mit $r_0, r_1, \dots$ bezeichnet. Die Entfernungen der aufeinander folgenden Flächen sind wie früher $d_1, d_2, \dots$, die Brechungsexponenten

werden der Reihe nach $n_0, n_1 \dots$ genannt, wobei zu bemerken ist, dass n_0 gleich Eins ist, da der Brechungsexponent der Luft gleich der Einheit gesetzt werden kann.

In der neuen Schreibweise werden die Gleichungen (69), wenn man den Index κ unterdrückt, sich also auf die Brechung an der ersten Fläche beschränkt:

$$\left. \begin{aligned} \frac{n_1}{p} - \frac{n_0}{p_0} &= \frac{n_1 - n_0}{r_0} \\ p_1 &= p' - d_1 \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (135)$$

Für jede folgende Fläche ist also der Index um eine Einheit zu erhöhen.

Aus den Gleichungen (135) folgen leicht die Gleichungen:

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_0} + \frac{n_0}{n_1} + \frac{1}{r_0} (n_1 - n_0) \frac{1}{n_1} \dots \dots (136)$$

$$\frac{1}{p_1} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{1 - \frac{d_1}{p}} \dots \dots \dots (137)$$

mit denen die Durchrechnung von Fläche zu Fläche vorzunehmen ist.

Als Beispiel wählen wir die schon im ersten Kapitel nach anderer Richtung hin untersuchte halbkugelförmige Konvexplanlinse. Zugrunde gelegt sind die Daten:

Radien	Dicke	Brechungsexponenten
$r_0 = 1$	$d = 1$	$n_0 = 1$
$r_1 = \infty$		$n_1 = 1.6$
		$n_2 = 1$

Die Berechnung der Schnittweiten der Parachialstrahlen

geschieht durch sukzessive Anwendung der Gleichungen (136), (137):

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{p_0} \cdot \frac{n_0}{n_1} + \frac{1}{r_0} (n_1 - n_0) \frac{1}{n_1}; \quad \frac{1}{p_1} = \frac{1}{p'} \cdot \frac{1}{1 - \frac{d_1}{p'}}$$

Nimmt man die Lichtquelle unendlich fern an, so wird $p_0 = \infty$ und es ergibt sich, wenn man für jede folgende Kolonne den Index der Schnittweiten, Brechungsexponenten etc. um Eins erhöht:

$\log \frac{1}{p_0}$		0,77 815 — 1
$\log \frac{n_0}{n_1}$		0,20 411
$\log \frac{n_0}{n_1} \cdot \frac{1}{p_0}$		<u>0,98 227 — 1</u>
$\log \frac{1}{r_0}$	0	
$\log (n_1 - n_0)$	0,77 815 — 1	
$\log \frac{1}{n_1}$	0,79 588 — 1	
$\log \frac{1}{r_0} (n_1 - n_0) \frac{1}{n_1}$	<u>0,57 403 — 1</u>	
$\frac{n_0}{n_1} \cdot \frac{1}{p_0}$	0	0,96
$\frac{1}{r_0} \frac{n_1 - n_0}{n_1}$	<u>0,375</u>	<u>0</u>
$\frac{1}{p'}$	0,375	0,96
$\log \frac{1}{p'}$	0,57 403 — 1	0,98 227 — 1
$\log d_1$	<u>0</u>	
$\log \frac{d_1}{p'}$	0,57 403 — 1	

$1 - \frac{d_1}{p'}$	0,625
$\log \frac{1}{p'}$	1,57 403 — 3
$\log \left(1 - \frac{d_1}{p'}\right)$	<u>0,79 588 — 1</u>
$\log \frac{1}{p_1}$	0,77 815 — 1

Folglich erhält man:

$$\begin{aligned}\log p' &= 0,42\ 597 \\ \log p'' &= 0,01\ 773 \\ \log p_1 &= 0,22\ 185\end{aligned}$$

Berechnung der Grössen A zufolge
Gleichung^a (110).

$\log p_1$	1,22 185 — 1
$\log p'$	<u>0,42 597</u>
	0,79 588 — 1
$A_0 = 1$	$A_1 = 0,625$

Berechnung der Grössen B zufolge
Gleichung (112).

$\log p'$	0,42 597	0,01 773
$\log n_1$	<u>0,20 412</u>	<u>0</u>
$\log p' \cdot n_1$	0,63 009	0,01 773

$\log \frac{1}{p' \cdot n_1}$	0,36 991 — 1	0,98 227 — 1
$\log p_0$		0,22 185
$\log n_0$		0,20 412
$\log n_0 \cdot p_0$		0,42 597
$\log \frac{1}{p_0 \cdot n_0}$		0,57 403 — 1
$\frac{1}{p' n_1}$	0,23 437	0,96
$\frac{1}{p_0 n_0}$	0	0,375
B_0	0,23 427	0,585
$\log B_0$	0,36 991 — 1	0,76 716 — 1

Berechnung der Grössen Q nach
Gleichung (III).

$\frac{1}{r_0}$	1	0
$\frac{1}{p'}$	0,375	0,96
$\frac{1}{r_0} - \frac{1}{p'}$	0,625	—0,96

$\log \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{p'} \right)$	0,79 588 — 1	0,98 227 — 1 —
$\log n_1$	0,20 412	0
$\log Q_0$	0,00 000	0,98 227 — 1 —
Q_0	1	— 0,96

Berechnung der Grössen C nach
Gleichung (128a).

$\log n_1$	0,20 412
$\log A_1$	0,79 588 — 1
$\log n_1 A_1$	0,00 000

$\log \frac{1}{n_1 A_1}$	0
$\log d_1$	0
$\log C_1$	0
C_1	1

Berechnung der Koeffizienten von z und
der von z freien Glieder nach Gleichung (130).

$\log A_0^2$		0,59 176 — 1
$\log C_0$		0
$\log Q_0$		0,98 227 — 1 —
$\log A_0^2 C_0 Q_0$		0,57 403 — 1 —
$A_0^2 C_0 Q_0$		— 0,375
$1 + A_0^2 C_0 Q_0$		0,265
$\log A_0^2$		0,59 176 — 1
$\log Q_0$		0,98 227 — 1 —
$\log A_0^2 Q_0$		0,57 403 — 1 —
$\log A_0^2$	0	0,59 176 — 1
$\log B_0$	0,36 991 — 1	0,76 716 — 1
$\log Q_0$	0	0,98 227 — 1 —
$\log A_0^2 B_0 Q_0$	0,36 991 — 1	0,34 119 — 1 —
$\log A_0^2 Q_0$	0	0,57 403 — 1 —
$\log A_0^2 B_0 Q_0 \cdot A_0^2 Q_0$	0,36 991 — 1	0,91 522 — 2
$\log A_0^2 B_0 Q_0$	0,36 991 — 1	0,34 119 — 1 —
$\log (1 + A_0^2 C_0 Q_0)$	0	0,79 588 — 1
$\log A_0^2 B_0 Q_0 (1 + A_0^2 C_0 Q_0)$	0,36 991 — 1	0,13 707 — 1 —
$A_0^2 B_0 Q_0 (1 + A_0^2 C_0 Q_0)$	0,23 437	— 0,13 711
$A_0^2 B_0 Q_0 \cdot A_0^2 Q_0$	0,23 437	0,082 266

Summation über die von z freien Glieder	Summation über die Koeffizienten von z
0,23 437	0,23 437
0,08 2266	0,13 711
0,31 6636	0,09 726

Die Gleichung zur Berechnung von z wird dann also
zufolge Gleichung (130):

$$0,31\ 6636 + 0,09\ 726\ z = 0$$

Folglich ergibt sich:

$$z = - \frac{0,31\ 6636}{0,09\ 726}$$

Also nach Gleichung (133):

$$x_1 = \frac{0,09\ 726}{0,31\ 6636} = 0,3072$$

oder abgekürzt

$$x_1 = 0,31 ,$$

d. h. der [M. B.] liegt 0,31 Einheiten — den Radius der
vorderen Fläche als Einheit genommen — von der ersten
Linsenfläche entfernt, wie schon oben erwähnt war.

Kapitel III.

Anwendung der Theorie der natürlichen Blende auf spezielle Fälle.

Schon bei einem so einfachen Fall wie ihn die halbkugelförmige Konvexplanlinse bietet, war die Berechnung des Ortes des [M. B.] im Objektraum mit Hilfe der Gleichung (130) ziemlich umständlich, umsomehr wird dies bei Systemen aus mehreren brechenden Flächen der Fall sein besonders dann, wenn es sich um die Neukonstruktion eines Systems handelt, denn hierbei ist man gezwungen, die Konstanten verschiedentlich zu ändern, und nach jeder Aenderung müsste man von neuem die Berechnung des Ortes des [M. B.] im Objektraum in der oben angegebenen Weise vornehmen. Es erschien dem Verfasser daher geboten, für einige Fälle, die infolge ihrer Wichtigkeit von besonderem Interesse sind, neue Formeln aufzustellen, mit deren Hilfe man die Bestimmung des Ortes des [M. B.] im Objektraum leichter vornehmen kann als nach Gleichung (130).

§ 1. Die unendlich dünne, in Luft befindliche Linse.

Im Fall einer unendlich dünnen Linse kann man zunächst in Gleichung (130) die Dicken vernachlässigen. Es ist dann offenbar $A_x = 1$ und $C_x = 0$. Gleichung (130) geht über in:

$$\sum B_x Q_{xc} (Q_{xc} + z) = 0$$

oder:

$$\Sigma Q_{\kappa C}^2 \mathcal{A} \left(\frac{1}{nc} \right)_{\kappa} + z \Sigma Q_{\kappa C} \mathcal{A} \left(\frac{1}{nc} \right)_{\kappa} = 0$$

$$z = - \frac{\Sigma Q_{\kappa C}^2 \mathcal{A} \left(\frac{1}{nc} \right)_{\kappa}}{\Sigma Q_{\kappa C} \mathcal{A} \left(\frac{1}{nc} \right)_{\kappa}} \quad \dots \quad (138)$$

Für eine einzige dünne, von Luft umgebene Linse ist ferner:

$$Q_{1C} = n_1 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1} \right) = n_1' \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1'} \right)$$

$$Q_{2C} = n_2 \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{c_2} \right) = n_2' \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{c_2'} \right)$$

$$c_2 = c_1'$$

Bezeichnet man mit n den Brechungsexponenten der Linsensubstanz, so ist:

$$n_1 = n_2' = 1$$

$$n_1' = n_2 = n$$

Setzt man ferner noch:

$$c_1 = a, \quad c_2' = b, \quad \frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

und setzt man weiter $a = \infty$, $b = f$, nimmt also an, dass das Objekt sehr entfernt ist, dann wird:

$$Q_{1C} = \frac{1}{r_1} = n \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1'} \right)$$

$$Q_{2C} = n \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{c_2} \right) = \frac{1}{r_2} - \frac{1}{f}$$

und also:

$$\frac{1}{c_1} = \frac{1}{c_2} = \frac{n-1}{n \cdot r_1}$$

$$J \left(\frac{1}{nc} \right)_1 = \frac{1}{n_1' c_1'} - \frac{1}{n_1 c_1} = \frac{n-1}{n^2 r_1}$$

$$J \left(\frac{1}{nc} \right)_2 = \frac{1}{n_2' c_2'} - \frac{1}{n_2 c_2} = \frac{1}{f} - \frac{n-1}{n^2 r_1}$$

Also ergibt sich:

$$z = - \frac{\frac{1}{r_1^2} \frac{n-1}{n^2 r_1} + \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f} \right)^2 \left(\frac{1}{f} - \frac{n-1}{n^2 r_1} \right)}{\frac{1}{r_1} \frac{n-1}{n^2 r_1} + \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f} \right) \left(\frac{1}{f} - \frac{n-1}{n^2 r_1} \right)} . . . \quad (139)$$

eine Formel, die schon Herr Gleichen¹ entwickelt hat. Wir wollen die Gleichung (139) noch weiter vereinfachen.

Für eine in Luft befindliche Linse ohne Dicke gilt bekanntlich die Beziehung:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (140)$$

Setzt man f gleich einer Konstanten, so kann man in Gleichung (140) r_1 als unabhängige und r_2 als abhängige Variable auffassen. Aus Gleichung (140) folgt:

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{r_1} - \frac{1}{f(n-1)} \quad (141)$$

Setzt man in Gleichung (139) für $\frac{1}{r_1}$ den Wert (141) ein und beachtet ferner, dass für den vorliegenden Fall

$x_1 = -\frac{1}{z}$ ist (siehe Gl. 133), so geht Gleichung (134) über in:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1} \frac{n-1}{n^2 r_1} + \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{f(n-1)} - 1 \right) \left(1 - \frac{n-1}{n^2 r_1} \right)}{\frac{1}{r_1^2} \frac{n-1}{n^2 r_1} + \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{f(n-1)} - 1 \right)^2 \left(1 - \frac{n-1}{n^2 r_1} \right)}$$

Nach einiger Umformung erhält man hieraus:

$$x_1 = \frac{f^2 r_1 (n^3 - n^2 - n + 1) - fr_1^2 (n^3 - n^2)}{f^2 (n^3 - 3n + 2) - fr_1 (2n^3 - n^2 - n) + n^3 r_1^2} \quad (142)$$

Man führe folgende Grössen ein:

$$\left. \begin{aligned} \mu_1 &= n^3 - n^2 - n + 1 \\ \mu_2 &= n^3 - n^2 \\ \mu_3 &= n^3 - 3n + 2 \\ \mu_4 &= 2n^3 - n^2 - n \\ \mu_5 &= n^3, \end{aligned} \right\} \quad \cdot \cdot \cdot \quad (143)$$

wobei zu beachten ist, dass diese Grössen nur von dem Brechungsexponenten n der Linsensubstanz abhängen. Gleichung (142) geht dann über in:

$$x_1 = \frac{f^2 r_1 \mu_1 - fr_1^2 \mu_2}{f^2 \mu_3 - fr_1 \mu_4 + r_1^2 \mu_5} \quad \cdot \cdot \cdot \quad (144)$$

Setzt man jetzt $f=1$, was ohne Beschränkung der Allgemeinheit geschehen kann, so wird:

$$x_1 = \frac{r_1 \mu_1 - r_1^2 \mu_2}{\mu_3 - r_1 \mu_4 + r_1^2 \mu_5} \quad \cdot \cdot \cdot \quad (145)$$

Wir sind also zu folgendem Resultat gekommen:

Will man für eine dünne, in Luft be-

findliche Linse den Ort des [M. B.] im Objektraum berechnen, so bestimme man aus dem Brechungsexponenten n der Linsensubstanz die Werte:

$$\mu_1 = n^3 - n^2 - n + 1$$

$$\mu_2 = n^3 - n^2$$

$$\mu_3 = n^3 - 3n + 2$$

$$\mu_4 = 2n^3 - n^2 - n$$

$$\mu_5 = n^3$$

Aus diesen Werten μ und dem Radius r_1 der vorderen Linsenfläche berechnet sich dann die Entfernung x_1 des [M. B.] im Objektraum vom Scheitel der Linse nach der Gleichung:

$$x_1 = \frac{r_1 \mu_1 - r_1^2 \mu_2}{\mu_3 - r_1 \mu_4 + r_1^2 \mu_5}$$

Hierbei ist noch zu beachten, dass $f=1$ angenommen ist.

Aus Gleichung (145) ist ersichtlich, dass bei einer dünnen Linse die Entfernung x_1 des [M. B.] im Objektraum von der Linse nur eine Funktion von r_1 allein ist, sobald man einen bestimmten Brechungsexponenten n der Linsensubstanz zugrunde legt.

Es soll jetzt für $n = 3/2$ untersucht werden, wie sich x_1 mit r_1 ändert, wobei also wieder $f=1$ gesetzt ist.

Aus $n = 3/2$ ergeben sich nach (143) die Werte:

$$\mu_1 = 5/8$$

$$\mu_4 = 3$$

$$\mu_2 = 9/8$$

$$\mu_5 = 27/8$$

$$\mu_3 = 7/8$$


Wir betrachten zunächst den Fall einer Plankonvex-

linse d. h. wir setzen $r_1 = \infty$. Gleichung (145) nimmt dann die unbestimmte Form $\frac{\infty}{\infty}$ an. Dividieren wir Zähler und Nummer der Gleichung (145) durch r_1^2 und setzen nachträglich $r_1 = \infty$, so erhalten wir:

$$x_1 = -\frac{\mu_2}{\mu_5} = \frac{1}{n} - 1 = -0,33 \dots$$

Tabelle I gibt nun die Lage des [M. B.] im Objekt-raum an, wenn r_1 das Intervall von $-\infty$ bis $+\infty$ durchläuft. Gleichzeitig ist noch immer der zugehörige Wert r_2 angegeben, wie er sich aus Gleichung (140) ergibt, wenn man $f = i$ setzt.

Tabelle 1.



Fi. 10

Radius r_1 dervorderen Linsenfläche	Radius r_2 der hinteren Linsenfläche	Entfern. des [M.B.] i. Objekt- raum v. d. Linse
— ∞	— 0,50	— 0,33
— 100	— 0,50	— 0,33
— 20	— 0,49	— 0,33
— 15	— 0,48	— 0,33
— 10	— 0,48	— 0,32
— 9	— 0,47	— 0,32
— 8	— 0,47	— 0,32
— 7	— 0,47	— 0,32
— 6	— 0,45	— 0,32
— 5	— 0,45	— 0,31
— 4	— 0,44	— 0,31
— 3	— 0,43	— 0,30
— 2	— 0,40	— 0,28
— 1	— 0,33	— 0,24
— 0,75	— 0,30	— 0,22
— 0,5	— 0,25	— 0,18
— 0,25	— 0,17	— 0,12
r_1 sehr klein	r_2 sehr klein	0
+ 0,25	+ 0,50	+ 0,26
+ 0,36	+ 1,29	+ 0,34
+ 0,5	∞	+ 0,14
+ 0,55	— 5,50	0
+ 0,75	— 1,50	— 0,31
+ 1	— 1	— 0,40
+ 1,19	— 0,86	— 0,41
+ 2	— 0,67	— 0,39
+ 3	— 0,60	— 0,37
+ 4	— 0,57	— 0,36
+ 5	— 0,56	— 0,36
+ 6	— 0,55	— 0,35
+ 7	— 0,54	— 0,35
+ 8	— 0,53	— 0,35
+ 9	— 0,53	— 0,35
+ 10	— 0,53	— 0,34
+ 15	— 0,52	— 0,34
+ 20	— 0,51	— 0,34
+ 30	— 0,51	— 0,34
+ 50	— 0,51	— 0,34
+ 100	— 0,50	— 0,34
+ ∞	— 0,50	— 0,33

In Fig. 15 ist nun die Kurve dargestellt, die sich ergibt, wenn man die Werte für r_1 auf der Abscissenachse und die zugehörigen Werte von x_1 auf der Ordinatenachse abträgt. Extreme Lagen nimmt der [M. B.] im Objektraum ein für $r_1 = 0,36$ und $r_1 = 1,19$.

Diskussion der Kurve.

Aus der Fig. 15 ersieht man folgendes: Für eine vordere Linse liegt der [M. B.] 0,33 Einheiten — die Brennweite als Einheit genommen —, d. heisst also um etwa $\frac{1}{3} f$ vor der Linse. Wird r_1 absolut genommen allmählich kleiner, so nähert sich der [M. B.] der Linse. Für einen sehr kleinen Betrag von r_1 fällt der [M. B.] mit dem Scheitel der Linse zusammen.

Nimmt jetzt r_1 positive Werte an, so tritt der [M. B.] im Objektraum hinter die Linse. Für $r_1 = 0,36$ nimmt er einen extremen Wert an, es ist dann $x_1 = 0,34$, d. h. der [M. B.] im Objektraum liegt ungefähr $\frac{1}{3} f$ hinter der Linse. Wächst r_1 noch mehr, so nähert sich der [M. B.] wieder der Linse, die er für $r_1 = 0,55$ erreicht. Für noch grössere Werte von r_1 tritt der [M. B.] wieder vor die Linse und erreicht für $r_1 = 1,19$ abermals einen extremen Wert, er liegt dann 0,41 Einheiten von der Linse. Wächst r_1 noch mehr, so wird x_1 wieder kleiner und nähert sich dem Werte — 0,33, den er für $r_1 = \infty$, d. h. für eine vordere Linse erreicht.

Spezielle Fälle:

Es soll die Lage des [M. B.] im Objektraum ermittelt werden für einige Fälle, in denen der Radius r_2 der hinteren Linsenfläche eine vorgeschriebene Grösse hat.

1. Hinten plane Linse.

Aus der Gleichung (140) ergibt sich, wenn man $r_2 = \infty$ setzt: $r_1 = 0,5$. Aus der Tabelle I entnimmt man den zugehörigen Wert $x_1 = 0,14$, d. h. bei einer hinten planen

Linse ohne Dicke liegt der [M. B.] im Objektraum 0,14 Einheiten — f als Einheit genommen — hinter der Linse.

2. Die bikonvexe gleichseitige Linse.

In diesem Falle ist $r_2 = r_1$. Gleichung (140) gibt $r_1 = 1$ zufolge der Tabelle I ist dann $x_1 = 0,4$. Bei dieser Linse hat also der [M. B.] nahezu seine extremste Lage vor der Linse erreicht.

3. Die bikonkave gleichseitige Linse.

In Gleichung 144 ist jetzt zu setzen für $r_1: -r_1$ und für $r_2:r_1$. Es ergibt sich $r_1 = -1$. Die Tabelle I liefert $x_1 = -0,24$.

Aus Gleichung (142) folgt übrigens, dass, wenn man f ver -n-facht, was dadurch geschieht, dass man die beiden Radien n Mal so gross wählt, sich auch x_1 ver -n-facht.

§ 2. System aus zwei dünnen Linsen im Abstände e voneinander.

Um in einem beliebigen zentrierten System brechender Kugelflächen den Ort des [M. B.] im Objektraum zu ermitteln, hatte sich die Gleichung ergeben:

$$\sum A_x^2 B_x Q_{xc} [A_x^2 Q_{xc} + z(1 + A_x^2 C_x Q_{xc})] = 0, \dots \quad (146)$$

wo die Summierung von $x=1$ bis $x=m$ vorzunehmen war, wenn das System aus m brechenden Flächen bestand. Aus Gleichung (146) folgt:

$$\sum A_x^4 B_x Q_{xc}^2 + z \sum A_x^2 B_x Q_{xc} (1 + A_x^2 C_x Q_{xc}) = 0$$

oder

$$z = - \frac{\sum A_x^4 B_x Q_{xc}^2}{\sum A_x^2 B_x Q_{xc} (1 + A_x^2 C_x Q_{xc})} \quad (147)$$

Im vorliegenden Falle ist $n_1 = 1$, denn wir denken

uns die Linsen von Luft umgeben. Nimmt man ausserdem $c_1 = \infty$ an, so wird Gleichung (147), wenn man Gleichung (133) berücksichtigt:

$$x_1 = \frac{\sum A^2_{\kappa} B_{\kappa} Q_{\kappa C} (1 + A^2_{\kappa} C_{\kappa} Q_{\kappa C})}{\sum A^4_{\kappa} B_{\kappa} Q^2_{\kappa C}} \quad . \quad . \quad (148)$$

In dieser Gleichung ist zufolge (110), (112), (128a), (111):

$$A_{\kappa} = \frac{c_{\kappa} \cdot c_{\kappa-1} \cdot \dots \cdot c_2}{c'_{\kappa-1} \cdot c'_{\kappa-2} \cdot \dots \cdot c_1} \quad . \quad . \quad . \quad (149)$$

$$B_{\kappa} = \mathcal{A}\left(\frac{1}{nc}\right)_{\kappa} = \frac{1}{n_{\kappa} c'_{\kappa}} - \frac{1}{n_{\kappa} c_{\kappa}} \quad . \quad . \quad . \quad (150)$$

$$C_{\kappa} = \sum_{\lambda=2}^{\lambda=\kappa} \frac{d_{\lambda-1}}{n_{\lambda} A_{\lambda-1} A_{\lambda}} \quad . \quad . \quad . \quad (151)$$

$$O_{\kappa C} = n'_{\kappa} \left(\frac{1}{r_{\kappa}} - \frac{1}{c'_{\kappa}} \right) = n_{\kappa} \left(\frac{1}{r_{\kappa}} - \frac{1}{c_{\kappa}} \right) \quad . \quad (152)$$

Im vorliegenden Falle ist die Anzahl der brechenden Flächen vier. Setzt man also unter Berücksichtigung von (149), (150), (151), (152) in (148) die Grösse κ der Reihe nach 1, 2, 3, 4, so erhält man:

$$x_1 = \frac{A_1^2 B_1 Q_1 (1 + A_1^2 C_1 Q_1) + A_2^2 B_2 Q_2 (1 + A_2^2 C_2 Q_2)}{A_1^4 B_1 Q_1^2 + A_2^4 B_2 Q_2^2 + A_3^4 B_3 Q_3^2 + A_4^4 B_4 Q_4^2} + \frac{A_3^2 B_3 Q_3 (1 + A_3^2 C_3 Q_3) + A_4^2 B_4 Q_4 (1 + A_4^2 C_4 Q_4)}{A_1^4 B_1 Q_1^2 + A_2^4 B_2 Q_2^2 + A_3^4 B_3 Q_3^2 + A_4^4 B_4 Q_4^2} \quad (153)$$

Aus Gleichung (149) folgt, wenn man κ der Reihe nach 1, 2, 3, 4 setzt:

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= 1 \\ A_2 &= \frac{c_2}{c_1'} \\ A_3 &= \frac{c_3}{c_2'} \frac{c_2}{c_1'} \\ A_4 &= \frac{c_4}{c_3'} \frac{c_3}{c_2'} \frac{c_2}{c_1'} \end{aligned} \right\} \dots \dots (154)$$

Ebenso folgt aus Gleichung (150):

$$\left. \begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{n_1' c_1'} - \frac{1}{n_1 c_1} \\ B_2 &= \frac{1}{n_2' c_2'} - \frac{1}{n_2 c_2} \\ B_3 &= \frac{1}{n_3' c_3'} - \frac{1}{n_3 c_3} \\ B_4 &= \frac{1}{n_4' c_4'} - \frac{1}{n_4 c_4} \end{aligned} \right\} \dots \dots (155)$$

Aus Gleichung (151) folgt:

$$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 &= \frac{d_1}{n_2 A_1 A_2} \\ C_3 &= \frac{d_1}{n_2 A_1 A_2} + \frac{d_2}{n_3 A_2 A_3} \\ C_4 &= \frac{d_1}{n_2 A_1 A_2} + \frac{d_2}{n_3 A_2 A_3} + \frac{d_3}{n_4 A_3 A_4} \end{aligned} \right\} (156)$$

Aus Gleichung (152) endlich folgt:

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= n_1' \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1'} \right) = n_1 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1} \right) \\ Q_2 &= n_2' \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{c_2'} \right) = n_2 \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{c_2} \right) \\ Q_3 &= n_3' \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{c_3'} \right) = n_3 \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{c_3} \right) \\ Q_4 &= n_4' \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{c_4'} \right) = n_4 \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{c_4} \right) \end{aligned} \right\} (157)$$

Die Grössen A_x, B_x, C_x, Q_{xc} hängen also nur ab von den Grössen n_x, c_x, d_x . Während die beiden Grössen n_x und d_x zu den Konstanten des Systems gehören, sollen die Grösse c_x jetzt bestimmt werden, und zwar sollen sie als Funktionen der Konstanten des Systems dargestellt werden.

Nach (69) ist für zwei aufeinander folgende Flächen eines beliebigen zentrierten Systems:

$$\left. \begin{aligned} \frac{n'_{x-1}}{c'_{x-1}} - \frac{n_{x-1}}{c_{x-1}} &= \frac{n'_{x-1} - n_{x-1}}{r_{x-1}} \\ c_x &= c'_{x-1} - d_{x-1} \\ \frac{n'_x}{c'_x} - \frac{n_x}{c_x} &= \frac{n'_{x-1} - n_x}{r_x} \end{aligned} \right\} \quad (158)$$

Setzt man in (158) x der Reihe nach 2, 3, 4 so folgt:

$$\left. \begin{aligned} \frac{n'_1}{c'_1} - \frac{n_1}{c_1} &= \frac{n'_1 - n_1}{r_1} \\ c_2 &= c'_1 - d_1 \\ \frac{n'_2}{c'_2} - \frac{n_2}{c_2} &= \frac{n'_2 - n_2}{r_2} \\ c_3 &= c'_2 - d_2 \\ \frac{n'_3}{c'_3} - \frac{n_3}{c_3} &= \frac{n'_3 - n_3}{r_3} \\ c_4 &= c'_3 - d_3 \\ \frac{n'_4}{c'_4} - \frac{n_4}{c_4} &= \frac{n'_4 - n_4}{r_4} \end{aligned} \right\} \quad (160)$$

Der Brechungsexponent der beiden Linsensubstanzen sei bezgl. v_1 und v_2 , der Brechungsexponent der Luft gleich Eins. Dann ist also:

$$\left. \begin{aligned} n_1 &= n_2' = n_3 = n_4' = 1 \\ n_1' &= n_2 = v_1 \\ n_3' &= n_4 = v_2 \end{aligned} \right\} \quad (160)$$

Berücksichtigt man ferner, dass $c_1 = \infty$ angenommen war und dass, da die Linsen unendlich dünn sind und ihr Abstand gleich e ist, $d_1 = d_3 = 0$, $d_2 = e$ ist, so geht (159) über in:

$$\left. \begin{aligned} \frac{v_1}{c_1'} &= \frac{v_1 - 1}{r_1} \\ c_2 &= c_1' \\ \frac{1}{c_2'} - \frac{v_1}{c_2} &= \frac{1 - v_1}{r_2} \\ c_3 &= c_2' - e \\ \frac{v_2}{c_3'} - \frac{1}{c_3} &= \frac{v_2 - 1}{r_3} \\ c_4 &= c_3' \\ \frac{1}{c_4'} - \frac{v_2}{c_4} &= \frac{1 - v_2}{r_4} \end{aligned} \right\} \quad (161)$$

Aus (161) folgt leicht:

$$\frac{1}{c_2'} = \frac{v_1 - 1}{r_1} + \frac{1 - v_1}{r_2} = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (162)$$

und ebenso:

$$\frac{1}{c_4'} - \frac{1}{c_3} = (v_2 - 1) \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (163)$$

Man setze:

$$\frac{1}{f_1} = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (164)$$

und

$$\frac{1}{f_2} = (v_2 - 1) \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (165)$$

Dann folgt aus (162), (161), (163)

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{c_2'} &= \frac{1}{f_1} \\ c_3 &= c_2' - e \\ \frac{1}{c_4'} - \frac{1}{c_3} &= \frac{1}{f_2} \end{aligned} \right\} \quad (166)$$

Aus (166) folgt:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{c_2'} &= \frac{1}{f_1} \\ \frac{1}{c_3} &= \frac{1}{f_1 - e} \\ \frac{1}{c_4'} &= \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_1 - e} \end{aligned} \right\} \quad (167)$$

Die noch fehlenden Grössen c lassen sich mit Hilfe der optischen Invariante Q ermitteln. Aus (157) folgt, wenn man (160) berücksichtigt und $c_1 = \infty$ setzt:

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{c_1'} = \frac{1}{v_1 r_1}$$

und also:

$$\frac{1}{c_1'} = \frac{1}{r_1} \frac{v_1 - 1}{r_1}$$

Dann ist nach (161)

$$\frac{1}{c_2} = \frac{1}{r_1} \frac{v_1 - 1}{v_1}$$

Aus (157) folgt:

$$\begin{aligned} v_2 \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{c_3'} \right) &= \frac{1}{r_3} - \frac{1}{f_1 - e} \\ \frac{1}{c_3'} &= \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2} + \frac{1}{v_2 (f_1 - e)} \end{aligned}$$

Also ergibt sich aus (161):

$$\frac{1}{c_4} = \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2} + \frac{1}{v_2 (f_1 - e)}$$

Für die reziproken Werte der Grössen c_x haben sich mithin folgende Werte ergeben:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{c_1} &= 0 \\ \frac{1}{c_1'} &= \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1} \\ \frac{1}{c_2} &= \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1} \\ \frac{1}{c_2'} &= \frac{1}{f_1} \\ \frac{1}{c_3} &= \frac{1}{f_1 - e} \\ \frac{1}{c_3'} &= \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{1}{f_1 - e} \\ \frac{1}{c_4} &= \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{1}{f_1 - e} \\ \frac{1}{c_4'} &= \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_1 - e} \end{aligned} \right\} \quad (167)$$

Setzt man die Werte aus (167) ein in (154), (155), (156), (157), so ergibt sich:

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= 1 \\ A_2 &= 1 \\ A_3 &= \frac{f_1 - e}{f_1} \\ A_4 &= \frac{f_1 - e}{f_1} \end{aligned} \right\} \quad (168)$$

$$\left. \begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \\ B_2 &= \frac{1}{f_1} - \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \\ B_3 &= \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{f_1 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} \\ B_4 &= \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_1 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{v_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2^2} \end{aligned} \right\} \quad (169)$$

$$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 &= 0 \\ C_3 &= \frac{ef_1}{f_1 - e} \\ C_4 &= \frac{ef_1}{f_1 - e} \end{aligned} \right\} \quad (170)$$

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= \frac{1}{r_1} \\ Q_2 &= \frac{1}{r_1} - \frac{1}{f_1} \\ Q_3 &= \frac{1}{r_3} - \frac{1}{f_1 - e} \\ Q_4 &= \frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1 - e} \end{aligned} \right\} \quad (171)$$

Aus (168), (169), (170), (171) ergeben sich folgende Ausdrücke.

$$\left. \begin{aligned} A_1^2 B_1 Q_1 &= \frac{1}{r_1^2} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \\ A_2^2 B_2 Q_2 &= \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f_1} \right) \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \right) \\ A_3^2 B_3 Q_3 &= \left(\frac{f_1 - e}{f_1} \right)^2 \left(\frac{1}{v_3} - \frac{1}{f_1 - e} \right) \left(\frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{f_1 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (172)$$

$$A_4^2 B_4 Q_4 = \left. \begin{aligned} & \left(\frac{f_1 - e}{f_1} \right)^2 \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1 - e} \right) \left(\frac{1}{f_2} + \right. \\ & \left. \frac{1}{f_1 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{r_3} \frac{v_2 - 1}{v_2^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (172)$$

$$\left. \begin{aligned} 1 + A_1^2 C_1 Q_1 &= 1 \\ 1 + A_2^2 C_2 Q_2 &= 1 \\ 1 + A_3^2 C_3 Q_3 &= 1 + \frac{e(f_1 - e)}{f_1} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{f_1 - e} \right) \\ 1 + A_4^2 C_4 Q_4 &= 1 + \frac{e(f_1 - e)}{f_1} \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1 - e} \right) \end{aligned} \right\} \quad (173)$$

$$\left. \begin{aligned} A_1^4 B_1 Q_1^2 &= \frac{1}{r_1^3} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \\ A_2^4 B_2 Q_2^2 &= \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f_1} \right)^2 \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{r_1} \cdot \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \right) \\ A_3^4 B_3 Q_3^2 &= \left(\frac{f_1 - e}{f_1} \right)^4 \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{f_1 - e} \right)^2 \left(\frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{f_2 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} \right) \\ A_4^4 B_4 Q_4^2 &= \left(\frac{f_1 - e}{f_1} \right)^4 \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1 - e} \right)^2 \left(\frac{1}{f_2} + \right. \\ & \left. \frac{1}{f_1 - e} \cdot \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} - \frac{1}{r_3} \cdot \frac{v_2 - 1}{v_2^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (174)$$

Setzt man die Ausdrücke (172), (173), (174) in Gleichung (153) ein, setzt man ferner zur Abkürzung:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \\ q_2 &= \frac{v_2 - 1}{v_2^2} \\ q_3 &= \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} \end{aligned} \right\} \quad (175)$$

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{f_1 - e}{f_1} \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{f_1 - 1} \end{aligned} \right\} \quad (176)$$

so erhält man für x_1 folgenden Ausdruck:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{r_1^2} \varrho_1 + \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{r_1} \varrho_1 \right) \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f_1} \right) + \\ &\quad \varepsilon_1^2 \left(\frac{1}{r_3} \varrho_2 - \varepsilon_2 \varrho_3 \right) \left(\frac{1}{r_3} - \varepsilon_2 \right) \left[1 + e \varepsilon_1 \left(\frac{1}{r_2} - \varepsilon_2 \right) \right] + \\ &\quad \varepsilon_1^2 \left(\frac{1}{f_2} + \varepsilon_2 \varrho_3 - \frac{1}{r_3} \varrho_2 \right) \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \varepsilon_2 \right) \left[1 + \right. \\ &\quad \quad \left. \varepsilon_1 e \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \varepsilon_2 \right) \right] : \frac{1}{r_1^3} \varrho_1 + \\ &\quad \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{r_1} \varrho_1 \right) \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{f_1} \right)^2 + \varepsilon_1^4 \left(\frac{1}{r_3} \varrho_2 - \varepsilon_2 \varrho_3 \right) \cdot \\ &\quad \left(\frac{1}{r_3} - \varepsilon_2 \right)^2 + \varepsilon_1^4 \left(\frac{1}{f_2} + \varepsilon_2 \varrho_3 - \frac{1}{r_3} \varrho_2 \right) \left(\frac{1}{r_4} - \frac{1}{f_2} - \varepsilon_2 \right)^2 \end{aligned} \right\} \quad (177)$$

In Gleichung (177) sind r_1 und r_2 zwei voneinander unabhängige Variable. Nimmt man aber jetzt f_1 als konstant an, so kann nur noch einer der beiden Radien z. B. r_1 als unabhängig aufgefasst werden, während r_2 bestimmt ist durch die Gleichung:

$$\frac{1}{f_1} = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

woraus folgt:

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{r_1} - \frac{1}{f_1} \cdot \frac{1}{v_1 - 1} \quad (178)$$

Analog erhält man:

$$\frac{1}{r_4} = \frac{1}{r_3} - \frac{1}{f_2} \cdot \frac{1}{v_2 - 1} \quad (179)$$

wo f_2 jetzt ebenfalls eine Konstante ist.

Zur Abkürzung setze man noch:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{v_1 - 1} + 1 &= \frac{v_1}{v_1 - 1} = q_0 \\ \frac{1}{v_2 - 1} + 1 &= \frac{v_2}{v_2 - 1} = q_0' \end{aligned} \right\} \quad (180)$$

Berücksichtigt man (178), (179), (180), so wird der Zähler von x_1 (Gl. 177) nach längerer Umformung:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r_1} \left[\frac{1}{f_1} (1 + q_0 q_1) \right] + \frac{1}{r_3^2} \left[\frac{1}{f_2} \cdot e \varepsilon_1^3 (1 + 2 q_0' q_2) \right] + \\ & \frac{1}{r_3} \left[\frac{1}{f_2} \cdot \varepsilon_1^2 (1 + q_0' q_2) - \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 (2 q_0' + q_0'^2 q_2) - \right. \\ & \left. \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 (2 q_0' q_3 + 2 + 2 q_0' q_2) \right] + \left[-\frac{1}{f_1^2} q_0 - \right. \\ & \left. \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^2 q_0' - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^2 \varepsilon_2 (1 + q_0' q_3) + \frac{1}{f_2^3} e \varepsilon_1^3 q_0'^2 + \right. \\ & \left. \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 (q_0'^2 q_3 + 2 q_0') + \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2^2 (1 + 2 q_0' q_3) \right] \quad (181) \end{aligned}$$

Ebenso wird der Nenner von (177) nach längerer Transformation:

$$\left. \begin{aligned} & \frac{1}{r_1^2} \left[\frac{1}{f_1} (1 + 2 q_0 q_1) \right] + \frac{1}{r_1} \left[-\frac{1}{f_1^2} (2 q_0 + q_0^2 q_1) \right] + \\ & \frac{1}{r_3^2} \left[\frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 (1 + 2 q_0' q_2) \right] + \frac{1}{r_3} \left[-\frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 (2 q_0' + \right. \\ & \left. q_0'^2 q_2) - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 (2 + 2 q_0' q_3 + 2 q_0' q_2) \right] + \\ & \left[\frac{1}{f_1^3} q_0^2 + \frac{1}{f_2^3} \varepsilon_1^4 \cdot q_0'^2 + \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 (1 + 2 q_0' q_3) + \right. \\ & \left. \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 (2 q_0' + q_0'^2 q_3) \right] \end{aligned} \right\} \quad (182)$$

Man führe nun folgende Abkürzungen ein:

$$\begin{array}{ll}
 \alpha_1 = 1 + \varrho_0 \varrho_1 & \alpha_8 = 1 + \varrho_0' \varrho_3 \\
 \alpha_2 = 1 + 2 \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_9 = \varrho_0'^2 \\
 \alpha_3 = 1 + \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_{10} = \varrho_0'^2 \varrho_3 + 2 \varrho_0 \\
 \alpha_4 = 2 \varrho_0' + \varrho_0'^2 \varrho_2 & \alpha_{11} = 1 + 2 \varrho_0' \varrho_3 \\
 \alpha_5 = 2 \varrho_0' \varrho_3 + 2 + 2 \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_{12} = 1 + 2 \varrho_0 \varrho_1 \\
 \alpha_6 = \varrho_0 & \alpha_{13} = 2 \varrho_0 + \varrho_0^2 \varrho_1 \\
 \alpha_7 = \varrho_0' & \alpha_{14} = \varrho_0^2
 \end{array}$$

und ferner

$$\begin{aligned}
 \beta_1 &= \frac{1}{f_1} \alpha_1 \\
 \beta_2 &= \frac{1}{f_2} \cdot e \varepsilon_1^3 \alpha_2 \\
 \beta_3 &= \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^2 \alpha_3 - \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 \alpha_4 - \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_5 \\
 \beta_4 &= -\frac{1}{f_1^2} \alpha_6 - \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^2 \alpha_7 - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^2 \varepsilon_2 \alpha_8 + \frac{1}{f_2^3} e \varepsilon_1^3 \alpha_9 + \\
 &\quad \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_{10} + \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} \\
 \beta_5 &= \frac{1}{f_1} \alpha_{12} \\
 \beta_6 &= -\frac{1}{f_1^2} \alpha_{13} \\
 \beta_7 &= \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \alpha_2 \\
 \beta_8 &= -\frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 \alpha_4 - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_5 \\
 \beta_9 &= \frac{1}{f_1^3} \alpha_{14} + \frac{1}{f_2^3} \varepsilon_1^4 \alpha_9 + \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} + \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_{10}
 \end{aligned}$$

Dann berechnet sich der Ort des [M. B.] im Objekt-
raum aus der Gleichung:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1} \beta_1 + \frac{1}{r_3^2} \beta_2 + \frac{1}{r_3} \beta_3 + \beta_4}{\frac{1}{r_1^2} \beta_5 + \frac{1}{r_1} \beta_6 + \frac{1}{r_3^2} \beta_7 + \frac{1}{r_3} \beta_8 + \beta_9}$$

Wir sind also zu folgendem Resultat gelangt:

Um in einem System aus zwei dünnen, in Luft befindlichen Linsen, die sich im Abstände e voneinander befinden, den [M.B.] im Objektraum zu ermitteln, verfähre man folgendermassen:

Aus den Brechungsexponenten v_1 und v_2 der beiden Linsesubstanzen berechne man folgende Grössen:

$$\left. \begin{aligned} \varrho_0 &= \frac{v_1}{v_1 - 1} & \varrho_2 &= \frac{v_2 - 1}{v_2^2} \\ \varrho_0' &= \frac{v_2}{v_2 - 1} & \varrho_3 &= \frac{v_2^2 - 1}{v_2^2} \\ \varrho_1 &= \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \end{aligned} \right\} \quad (183)$$

Aus f_1, f_2, e berechne man:

$$\varepsilon_1 = \frac{f_1 - e}{f_1} \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{f_1 - e} \quad (183a)$$

Aus den Grössen ϱ berechne man:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= 1 + \varrho_0 \varrho_1 & \alpha_8 &= 1 + \varrho_0' \varrho_3 \\ \alpha_2 &= 1 + 2 \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_9 &= \varrho_0'^2 \\ \alpha_3 &= 1 + \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_{10} &= \varrho'^2 \varrho_3 + 2 \varrho_0 \\ \alpha_4 &= 2 \varrho_0' + \varrho_0'^2 \varrho_2 & \alpha_{11} &= 1 + 2 \varrho_0' \varrho_3 \\ \alpha_5 &= 2 \varrho_0' \varrho_3 + 2 + 2 \varrho_0' \varrho_2 & \alpha_{12} &= 1 + 2 \varrho_0 \varrho_1 \\ \alpha_6 &= \varrho_0 & \alpha_{13} &= 2 \varrho_0 + \varrho_0^2 \varrho_1 \\ \alpha_7 &= \varrho_0' & \alpha_{14} &= \varrho_0^2, \end{aligned} \right\} \quad (184)$$

wobei zu bemerken ist, dass die Grössen α nur von den beiden Brechungsexponenten v_1 und v_2 abhängen. Endlich berechne man noch die Grössen

$$\left. \begin{aligned}
 \beta_1 &= \frac{1}{f_1} \alpha_1 \\
 \beta_2 &= \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \alpha_2 \\
 \beta_3 &= \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^2 \alpha_3 - \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 \alpha_4 - \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_5 \\
 \beta_4 &= -\frac{1}{f_1^2} \alpha_6 - \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^2 \alpha_7 - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^2 \varepsilon_2 \alpha_8 + \\
 &\quad \frac{1}{f_2^3} e \varepsilon_1^3 \alpha_9 + \frac{1}{f_2^2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_{10} + \frac{1}{f_2} e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} \\
 \beta_5 &= \frac{1}{f_1} \alpha_{12} \\
 \beta_6 &= -\frac{1}{f_1^2} \cdot \alpha_{13} \\
 \beta_7 &= \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \alpha_2 \\
 \beta_8 &= -\frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 \alpha_4 - \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_5 \\
 \beta_9 &= \frac{1}{f_1^3} \alpha_{14} + \frac{1}{f_2^3} \varepsilon_1^4 \alpha_9 + \frac{1}{f_2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} + \\
 &\quad \frac{1}{f_2^2} \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_{10}
 \end{aligned} \right\} \quad (185)$$

Dann berechnet sich die Entfernung x_1 von der ersten Linsenfläche nach der Gleichung:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1} \beta_1 + \frac{1}{r_3^2} \beta_2 + \frac{1}{r_3} \beta_3 + \beta_4}{\frac{1}{r_1^2} \beta_5 + \frac{1}{r_1} \beta_6 + \frac{1}{r_3^2} \beta_7 + \frac{1}{r_3} \beta_8 + \beta_9} \quad (186)$$

§ 3. Das Huygenssche und das Ramsdanske Okular.

Das Huygenssche Okular (Fig. 16) besteht bekanntlich aus zwei dünnen plankonvexen Linsen, dem Kollektiv K und dem Augenglase A, die beide ihre plane Seite dem Auge zuwenden. Ist f_1 die Brennweite des Kollektivs, f_2 die der Augenlinse, so ist:

$$f_1 = 2 f_2 .$$

Die Brechungsexponenten der beiden Linsen sind gleich. Vom Objektiv ausgehende Strahlen würden sich in q schneiden, wenn qp in der Brennebene des Objektivs liegend gedacht ist, und wenn die Lichtstrahlen nicht vorher durch das Kollektiv abgelenkt werden würden. Die Voraussetzung, dass $c_1 = \infty$ ist, ist hier also nicht erfüllt. Infolge der Reziprozität des Lichtweges kann man aber annehmen, die Lichtstrahlen kämen von der Bildseite her, aus dem Unendlichen, denn die Augenlinse macht die Strahlen parallel. A ist also dann die vordere, K die hintere Linse und die Bedingung $c_1 = \infty$ ist jetzt erfüllt. Zufolge der früheren Bezeichnungsweise sind dann die Radien der Reihe nach $r_1 = \infty$, r_2 , $r_3 = \infty$, r_4 . Nach Gleichung (186) berechnet sich dann die Entfernung des [M. B.] im Objektraum von der Augenlinse aus der Gleichung:

$$x_1 = \frac{\beta_4}{\beta_9} (187)$$

Beim Huygensschen Okular ist also der Ort des [M. B.] unabhängig von den Radien.

Wir wollen jetzt den Ort des [M. B.] im Objektraum für folgendes Okular berechnen:

Kollektiv	Entf. der beiden Linsen	Augenlinse
$f_1 = 2$	$e = 3/2$	$f_2 = 1$
$r_3 = \infty$		$r_1 = \infty$
$v = 1,6$		$v = 1,6$




Fig. 16

Da die Brechungsexponenten der beiden Linsen gleich sind, so ist nach (183):

$$\varrho_0 = \varrho_0', \quad \varrho_1 = \varrho_2$$

und man erhält:

$$\log \varrho_0 = 0,42\,597.2$$

$$\log \varrho_1 = 0,36\,991 - 1$$

$$\log \varrho_3 = 0,78\,488 - 1$$

Aus (184) berechnen sich die Werte:

$$\log \alpha_6 = 0,42\,597.2$$

$$\log \alpha_7 = 0,42\,597.2$$

$$\log \alpha_8 = 0,41\,913$$

$$\log \alpha_9 = 0,85\,194.2$$

$$\log \alpha_{10} = 0,98\,517.8$$

$$\log \alpha_{11} = 0,62\,839$$

$$\log \alpha_{14} = 0,85\,194.2$$

Aus (183a) folgt:

$$\varepsilon_1 = -e, \quad \varepsilon_2 = -\frac{1}{e}$$

Aus (185) folgen dann die beiden Grössen:

$$\beta_4 = -3,3231$$

$$\beta_4 = 8,2363$$

Für x_1 erhält man also aus Gleichung (187):

$$x_1 = -0,4034.$$

Beim Huygensschen Okular ist die Entfernung des Augenpunktes von der letzten brechenden Fläche d. h. also von der Planfläche des Augenglases gleich $\frac{1}{4} f$, wo f die Gesamtbrennweite des Okulars ist. Diese Gesamtbrennweite berechnet sich aus den Einzelbrennweiten und der Entfernung e der beiden Linsen nach der Gleichung:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{e}{f_1 f_2}$$

Man erhält:

$$f = \frac{4}{3}.$$

Der Augenabstand von der Planfläche des Augenglases ist demnach $\frac{1}{4} f = 0,33 \dots$, also angenähert gleich dem absoluten Betrage von x_1 . Wir kommen also zu folgendem Resultat:

Beim Huygensschen Okular fällt der Mittelpunkt der natürlichen Blende mit dem Augenpunkt zusammen.

Das Ramsdansch Okular besteht aus zwei plankonvexen Linsen, dem Kollektiv A — siehe Fig. 17 — und dem Augenglase B, die beide die konvexe Seite einander zuwenden. Strahlen, die vom Objektiv kommen und sich in einem Punkt q der Brennebene des Objektivs vereinigen, gelangen in das Kollektiv A. Auch beim Ramsdansch Okular ist also die Bedingung $c_1 = \infty$ (siehe oben) zunächst nicht erfüllt. Jedoch werden auch hier die Lichtstrahlen durch das Augenglas B parallel gemacht.

Wie beim Huygenschen Okular kann man also auch hier infolge der Reziprozität des Lichtweges annehmen, die Strahlen kämen von der Bildseite her aus dem Unendlichen, die Bedingung $c_1 = \infty$ ist also jetzt erfüllt. Die Radien sind der Reihe nach $r_1 = \infty, r_2, r_3, r_4 = \infty$. Kollektiv und Augenglas




Fig. 17

haben bekanntlich dieselbe Brennweite f und denselben Brechungsexponenten v .

Als Beispiel legen wir folgende Daten zugrunde:

Augenglas	Entf. der beiden Linsen	Kollektiv
$r_1 = \infty$	$e = 1$	$r_3 = 0,6$
$f = 1$		$f = 1$
$v = 1,6$		$v = 1,6$

Da die Brechungsexponenten gleich sind, so ist nach (183)

$$q_0 = q_0'; \quad q_1 = q_2$$

und man erhält:

$$\log q_0 = 0,42\,597.2$$

$$\log q_1 = 0,36\,991 - 1$$

$$\log q_3 = 0,78\,488 - 1$$

Aus (184) ergeben sich die Werte:

$\alpha_2 = 2,2500$	$\alpha_8 = 2,6250$
$\alpha_3 = 1,6250$	$\alpha_9 = 7,1112$
$\alpha_4 = 7,0001$	$\alpha_{10} = 9,6667$
$\alpha_5 = 6,5000$	$\alpha_{11} = 4,2500$
$\alpha_6 = 2,6667$	$\alpha_{14} = 7,1112$
$\alpha_7 = 2,6667$	

Aus (183a) folgt:

$$\varepsilon_1 = 0, \quad \varepsilon_2 = \infty$$

Aus (185) folgt $\beta_2 = 0$; die Grössen $\beta_3, \beta_4, \beta_7, \beta_8, \beta_9$ werden dagegen unbestimmt. Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, verkleinern wir den Abstand der beiden Linsen etwas, setzen also $e = 0,9$. Diese Verringerung des Abstandes geschieht bekanntlich auch in der Praxis, wo-

durch bewirkt wird, dass das beobachtende Auge die auf dem Kollektiv sich ablagernden Staubteilchen nicht sieht und zweitens, dass der Augengunkt, der für $e = 1$ streng im Scheitel des Augenglases liegt, etwas von der Linse fortrückt. Aus $e = 0,9$ folgt nach (183a)

$$\epsilon_1 = \frac{1}{10}, \epsilon_2 = 10$$

Dann ergeben sich aus (185) die Werte:

$$\begin{array}{ll} \beta_2 = 0,002\,025 & \beta_7 = 0,000\,225 \\ \beta_3 = -0,063\,175 & \beta_8 = -0,007\,200 \\ \beta_4 = -2,479\,966 & \beta_9 = 7,164\,078 \end{array}$$

Gleichung (186) nimmt im vorliegenden Fall die Form an:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_2}\beta_2 + \frac{1}{r_3}\beta_3 + \beta_4}{\frac{1}{r_2}\beta_7 + \frac{1}{r_3}\beta_8 + \beta_9} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (188)$$

woraus sich ergibt:

$$x_1 = -0,3606$$

Der [M. B.] liegt also wie der Augenpunkt um einen geringen Betrag vor der Planfläche der Augenlinse. Wir kommen also zu folgendem Resultat:

Auch beim Ramsdenschen Okular fällt der Mittelpunkt der natürlichen Blende mit dem Augenpunkt zusammen.

Daher erklärt sich wohl zum grössten Teil die gute Wirkung sowohl des Huygensschen wie auch des Ramsdenschen Okulars; denn der Umstand, dass der Mittel-

punkt der natürlichen Blende und der Augenkpunkt zusammenfallen, bewirkt, dass gerade diejenigen Strahlen in das Auge dringen, die durch die Spitzen der Kautiken d. h. durch Punkte höherer Strahlenvereinigung gehen.

§ 4. Das symmetrische Doublet.

Für jedes symmetrische Doublet gelten die Beziehungen:

$$\begin{aligned} r_4 &= -r_1 \\ r_3 &= -r_2 \\ f_1 &= f_2 \\ v_1 &= v_2 \end{aligned}$$

Setzt man für r_3 den Wert $-r_3$ in Gleichung (186) ein, so folgt:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1} \beta_1 + \frac{1}{r_2^2} \beta_2 - \frac{1}{r_2} \beta_3 + \beta_4}{\frac{1}{r_1} \beta_5 + \frac{1}{r_1} \beta_6 + \frac{1}{r_2^2} \beta_7 - \frac{1}{r_2} \beta_8 + \beta_9} \quad (189)$$

Es ist:

$$\frac{1}{f_1} = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Setzt man $f_1 = 1$, so ist:

$$1 = (v - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

oder

$$-\frac{1}{r_2} = \frac{1}{v_1 - 1} - \frac{1}{r_1} = q_4 - \frac{1}{r_1}, \quad (190)$$

wenn man setzt:

$$\varrho_4 = \frac{1}{v_1 - 1} \quad (191)$$

Diesen Wert für $-\frac{1}{r_2}$ führe man in Gleichung (189) ein und setze:

$$\begin{aligned} a_1 &= \beta_2 \\ a_2 &= \beta_1 - 2 \varrho_4 \beta_2 - \beta_3 \\ a_3 &= \varrho_4^2 \beta_2 + \varrho_4 \beta_3 + \beta_4 \\ a_4 &= \beta_5 + \beta_7 \\ a_5 &= \beta_6 - 2 \varrho_4 \beta_7 - \beta_8 \\ a_6 &= \varrho_4^2 \beta_7 + \varrho_4 \beta_8 + \beta_9, \end{aligned}$$

dann erhält man nach einigen Umformungen aus Gleichung (189):

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1^2} \alpha_1 + \frac{1}{r_1} \alpha_2 + \alpha_3}{\frac{1}{r_1^2} \alpha_4 + \frac{1}{r_1} \alpha_5 + \alpha_6} \quad (192)$$

Da $f_1 = f_2 = 1$ angenommen ist, so folgt aus (183a):

$$\varepsilon_1 = 1 - e, \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{1 - e} \quad (193)$$

Will man also bei einem symmetrischen Doublet die Lage des [M. B.] im Objektraum bestimmen, so berechne man zunächst aus dem Brechungsexponenten die Gössen:

$$\left. \begin{aligned} \varrho_0 &= \frac{v_1}{v_1 - 1} \\ \varrho_1 &= \frac{v_1 - 1}{v_1^2} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \varrho_3 &= \frac{v_1^2 - 1}{v_1^2} \\ \varrho_4 &= \frac{1}{v_1 - 1} \end{aligned} \right\} \quad (194)$$

und die Grössen:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= 1 + \varrho_0 \varrho_1 \\ \alpha_2 &= 1 + 2 \varrho_0' \varrho_2 \\ \alpha_3 &= 1 + \varrho_0' \varrho_2 \\ \alpha_4 &= 2 \varrho_0' + \varrho_0'^2 \varrho_2 \\ \alpha_5 &= 2 \varrho_0' \varrho_3 + 2 + 2 \varrho_0' \varrho_2 \\ \alpha_6 &= \varrho_0 \\ \alpha_7 &= \varrho_0' \\ \alpha_8 &= 1 + \varrho_0' \varrho_3 \\ \alpha_9 &= \varrho_0'^2 \\ \alpha_{10} &= \varrho_0'^2 \varrho_3 + 2 \varrho_0 \\ \alpha_{11} &= 1 + 2 \varrho_0' \varrho_3 \\ \alpha_{12} &= 1 + 2 \varrho_0 \varrho_1 \\ \alpha_{13} &= 2 \varrho_0 + \varrho_0^2 \varrho_1 \\ \alpha_{14} &= \varrho_0^2 \end{aligned} \right\} \quad (195)$$

Aus der Entfernung e der beiden Linsen berechne man die Grössen

$$\varepsilon_1 = 1 - e, \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{1 - e} \quad . \quad . \quad . \quad (196)$$

Ferner bestimme man die Werte:

$$\left. \begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= e \cdot \varepsilon_1^3 \alpha_2 \\ \beta_3 &= \varepsilon_1^2 \alpha_3 - e \varepsilon_1^3 \alpha_4 - e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_5 \\ \beta_4 &= -\alpha_6 - \varepsilon_1^2 \alpha_7 - \varepsilon_1^2 \varepsilon_2 \alpha_8 + e \varepsilon_1^3 \alpha_9 + e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2 \alpha_{10} \\ &\quad + e \varepsilon_1^3 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} \\ \beta_5 &= \alpha_{12} \\ \beta_6 &= -\alpha_{13} \\ \beta_7 &= \varepsilon_1^4 \alpha_2 \\ \beta_8 &= -\varepsilon_1^4 \alpha_4 - \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_5, \\ \beta_9 &= \alpha_{14} + \varepsilon_1^4 \alpha_9 + \varepsilon_1^4 \varepsilon_2^2 \alpha_{11} + \varepsilon_1^4 \varepsilon_2 \alpha_{10} \end{aligned} \right\} \quad (197)$$

die aus (185) dadurch entstehen, dass man $f_1 = f_2 = 1$ setzt.

Endlich berechne man noch die Grössen:

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= \beta_2 \\ a_2 &= \beta_1 - 2 \varrho_4 \beta_2 - \beta_3 \\ a_3 &= \varrho_4^2 \beta_2 + \varrho_4 \beta_3 + \beta_4 \\ a_4 &= \beta_5 + \beta_7 \\ a_5 &= \beta_6 - 2 \varrho_4 \beta_7 - \beta_8 \\ a_6 &= \varrho_4^2 \beta_7 + \varrho_4 \beta_8 + \beta_9 \end{aligned} \right\} \quad (198)$$

Die Entfernung x_1 des [M. B.] im Objekt-
raum von der ersten Linsenfläche ergibt
sich dann aus:

$$x_1 = \frac{\frac{1}{r_1^2} a_1 + \frac{1}{r_1} a_2 + a_3}{\frac{1}{r_1^2} a_4 + \frac{1}{r_1} a_5 + a_6} \quad (199)$$

Als Beispiel wählen wir:

$$\begin{aligned} r_1 &= 0,6 & e &= 0,1 \\ v_1 &= 1,6 \\ f_1 &= 1 \\ \text{u. symmetrisch} \end{aligned}$$

Aus (194) erhält man:

$$\begin{aligned} \log q_0 &= 0,42597.2 & \log q_3 &= 0,78488 - 1 \\ \log q_1 &= 0,36991 - 1 & \log q_4 &= 0,22185.9 \end{aligned}$$

Aus (195) folgt:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 1,6250 & \alpha_8 &= 2,6250 \\ \alpha_2 &= 2,2500 & \alpha_9 &= 7,1112 \\ \alpha_3 &= 1,6250 & \alpha_{10} &= 9,6667 \\ \alpha_4 &= 7,0001 & \alpha_{11} &= 4,2500 \\ \alpha_5 &= 6,5000 & \alpha_{12} &= 2,2500 \\ \alpha_6 &= 2,6667 & \alpha_{13} &= 7,0001 \\ \alpha_7 &= 2,6667 & \alpha_{14} &= 7,1112. \end{aligned}$$

Aus (196) folgt:

$$\epsilon_1 = \frac{9}{10}, \quad \epsilon_2 = \frac{10}{9}$$

Aus (197) folgt:

$$\begin{array}{ll} \beta_1 = 1,6250 & \beta_6 = -7,0001 \\ \beta_2 = 0,1640 & \beta_7 = 1,4762 \\ \beta_3 = 0,2794 & \beta_8 = -9,3310 \\ \beta_4 = -5,5053 & \beta_9 = 22,2662 \\ \beta_5 = 2,2500 & \end{array}$$

Aus (198) folgt:

$$\left. \begin{array}{ll} a_1 = 0,1640 & a_4 = 3,7262 \\ a_2 = 0,7988 & a_5 = -2,5899 \\ a_3 = -4,5839 & a_6 = 10,8150 \end{array} \right\} (200)$$

Nach (199) ergibt sich dann:

$$x_1 = -0,1660,$$

d. h. der [M. B.] liegt 0,166 Einheiten — die Grösse f als Einheit genommen — vor der ersten Linse.

Für die Praxis kommen hauptsächlich solche symmetrischen Doublets in Betracht, bei denen r_1 angenähert gleich r_2 und also auch r_3 gleich r_4 ist, d. h. also Doublets in Meniskenform. Es wird sich weiter unten zeigen, dass für solche symmetrischen Doublets der [M. B.] mit dem Symmetriepunkt zusammenfällt.

Um diese Verhältnisse noch etwas genauer zu untersuchen, erschien es dem Verfasser geboten, festzustellen, wie sich der Ort des [M. B.] im Objektraum ändert, wenn man den Radius r_1 der ersten brechenden Fläche als variable Grösse auffasst. In Gleichung (199) soll also jetzt r_1 als unabhängige, x_1 als abhängige Variable aufgefasst werden, die Grössen a dagegen werden als Konstante betrachtet, u. z. legen wir die Daten des soeben berechneten Beispiels zugrunde, sodass die Grössen a die Werte (200) haben. Lässt man r_1 das Intervall von $+\infty$ bis $-\infty$ durchlaufen, berechnet zu jedem Wert den zugehörigen von x_1 , so erhält man Tabelle II. Extreme Lagen nimmt der [M. B.] im Objektraum ein für $r_1 = 11,57$ und $r_1 = 0,091$.




Fig. 18

Tabelle II

Radius der I. brech. Fläche	Entfern. des [M.B.] im Objektraum v. d. I. Fläche
+ ∞	— 0,424
+ 100	— 0,424
+ 11,574	— 0,425
+ 10	— 0,424
+ 5	— 0,423
+ 2	— 0,396
+ 1,5	— 0,370
+ 1	— 0,303
+ 0,8	— 0,281
+ 0,6	— 0,166
+ 0,5	— 0,133
+ 0,3	— 0,002
+ 0,295	0
+ 0,2	+ 0,039
+ 0,1	+ 0,055
+ 0,0909	+ 0,056
r_1 sehr klein	+ 0,044
— 0,1	+ 0,009
— 0,121	0
— 0,2	— 0,038
— 0,3	— 0,089
— 0,5	— 0,179
— 0,8	— 0,268
— 1	— 0,305
— 2	— 0,379
— 5	— 0,413
— 10	— 0,420
— 100	— 0,424
— ∞	— 0,424

Diskussion der Kurve:

In Fig. (18) ist die Kurve dargestellt, die man erhält, wenn man r_1 auf der Abscissenachse und x_1 auf der Ordinatenachse abträgt. Aus der Figur ersieht man folgendes: Bei einem symmetrischen Doublet, dessen erste Fläche — und also auch die letzte — plan ist, liegt der [M. B.] 0,424 Einheiten — die Brennweite gleich Eins genommen — vor der ersten Linse. Wird jetzt der Radius absolut genommen kleiner, so nähert sich der [M. B.] der ersten Linse. Für $r_1 = -0,121$ ist $x_1 = 0$, d. h. der [M. B.] liegt im Scheitel der ersten Linse. Wird jetzt r_1 noch kleiner, so wird x_1 positiv, der [M. B.] im Objektraum liegt zwischen den Linsen. Für sehr kleine Werte von r_1 ist $x_1 = 0,044$, d. h. der [M. B.] im Objektraum liegt 0,044 Einheiten hinter der ersten Linse. Nimmt jetzt r_1 positive Werte an, so rückt der [M. B.] im Objektraum zunächst noch näher zur zweiten Linse. Für $r_1 = 0,0909$ nimmt er eine extreme Lage ein; er befindet sich 0,056 Einheiten hinter der ersten Linse, also ungefähr im Symmetriepunkt des Doublets. Wächst r_1 noch mehr, so nähert sich der [M. B.] im Objektraum wieder der ersten Linse; für $r_1 = 0,295$ liegt er wieder in ihrem Scheitel. Wird r_1 noch grösser, so rückt der [M. B.] wieder vor die erste Linse und erreicht hierbei ein Extremum für $r_1 = 11,574$, x_1 ist dabei $-0,425$. Wächst r_1 noch mehr, so nähert sich der [M. B.] allmählich dem Werte $-0,424$, den er für $r_1 = +\infty$, d. h. für ein Doublet, dessen erste und letzte Fläche plan sind, erreicht.

Auffallend ist die Aehnlichkeit des Verhaltens des [M. B.] bei dem symmetrischen Doublet und bei einer dünnen Linse.

Spezielle Fälle:

Es soll nun noch für einige spezielle Fälle, in denen das symmetrische Doublet vorgeschriebene Form hat, die Lage des [M. B.] im Objektraum berechnet werden.

1. Die erste und letzte Fläche des Doublets sollen plan sein. Dann ist also $r_1 = \infty$ und $r_2 = -0,6$. Aus der Tabelle ergibt sich $x_1 = -0,424$, d. h. der [M. B.] liegt um etwa $\frac{2}{5} f$ vor der ersten Linse.

2. Die zweite und dritte Fläche sollen plan sein. Dann ist also: $r_2 = \infty$, $r_1 = 0,6$. Die Tabelle liefert $x_1 = -0,166$. Der [M. B.] im Objektraum liegt also etwa $\frac{1}{6} f$ vor der ersten Linse.

3. Das Doublet soll aus zwei gleichseitigen bikonvexen Linsen bestehen, sodass man hat: $r_1 = -r_2$. Aus der Gleichung

$$1 = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2} \right)$$

folgt dann $r_1 = 1,2$. Gleichung (199) liefert $x_1 = 0,338$. Der [M. B.] liegt mithin um $\frac{1}{3} f$ vor der ersten Fläche.

4. Es soll untersucht werden, wie das symmetrische Doublet beschaffen sein muss, damit der [M. P.] mit dem Symmetriepunkt identisch ist.

Diese Bedingung ist offenbar dann erfüllt, wenn der [M. B.] im Objektraum mit der Eintrittspupille einer im Symmetriepunkt gedachten Aperturblende zusammenfällt.

Die Brennweiten der beiden Einzellinsen seien gleich 1, die Brechungsexponenten ihrer Substanzen 1,6, ihre Entfernung voneinander gleich $\frac{1}{10}$. Die Eintrittspupille der im Symmetriepunkt befindlichen Aperturblende liegt dann 0,053 Einheiten hinter der ersten Linse. Aus (199) erhält man also als Bedingungsgleichung für den Radius r_1 :

$$0,053 = \frac{a_1 + a_2 r_1 + a_3 r_1^2}{a_4 + a_5 r_1 + a_6 r_1^2}$$

Berücksichtigt man (200), so folgt hieraus:

$$r_1' = 0,133$$

$$r_1'' = 0,049.$$

Die zugehörigen Werte r_2' und r_2'' ergeben sich aus der Gleichung:

$$1 = (v_1 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Man erhält:

$$r_2' = 0,170$$

$$r_2'' = 0,053.$$

Der Bedingung, dass der [M. B.] mit dem Symmetriepunkt identisch ist, genügen also die beiden symmetrischen Doublets:

$r_1 = 0,133$	$r_1 = 0,049$
$r_2 = 0,170$	$r_2 = 0,053$
$v_1 = 1,6$	$v_1 = 1,6$
$f = 1$	$f = 1$
$e = 0,1$	$e = 0,1$
u. symmetr.	u. symmetr.

Die beiden Doublets sind also positive Menisken, sodass man zu dem schon oben erwähnten Resultat kommt:

Bei einem symmetrischen Doublet ist der Mittelpunkt der natürlichen Blende dann mit dem Symmetriepunkt identisch, wenn das Doublet ein positiver Meniskus ist.

Vorliegende Arbeit, die ich der hohen philosophischen Fakultät der Universität Rostock als Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde vorzulegen mich beehre, entstand auf Anregung von Herrn Regierungsrat Dr. A. Gleichen, der es mir gestatten möge, ihm an dieser Stelle für das wohlwollende Interesse, das er meiner Arbeit stets entgegenbrachte, und für die vielen wichtigen Ratschläge, die er mir erteilte, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Lebenslauf.

Ich, Willy Hinrichs, wurde am 26. August 1884 zu Berlin geboren. Ich bin preußischer Staatsangehöriger und evangelischer Konfession. Meine Ausbildung erhielt ich auf der I. Realschule zu Berlin und auf der Friedrichs-Werderschen Oberrealschule ebendasselbst, die ich Ostern 1905 mit dem Zeugnis der Reife verließ, um mich an der Universität Berlin dem Studium der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften zu widmen. Gleichzeitig besuchte ich die Kgl. Technische Hochschule zu Charlottenburg, um an Vorlesungen und Uebungen über angewandte Mathematik teilzunehmen. Die Promotionsprüfung bestand ich am 3. Februar 1910.

Ich nahm teil an den Vorlesungen und Uebungen folgender Herren Dozenten: Berlin: Blasius, Drude†, E. Fischer, Friedenthal, Frobenius, Gabriel, Hettner, Landau, Lasson, Lehmann-Filhés, Liebisch, Münch, Nernst, Paulsen†, Pfeleiderer†, Planck, Pringsheim, Roethe, Rubens, Schur, Schwarz, Simmel, Stock, Wehnelt. Charlottenburg: Hettner, Scheffers, Zühlke.

Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank.
